

Nobilis®

Ma5 + CLONE 30



Reg. SAGARPA - B-0273-063

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA.



DESCRIPCIÓN:

Vacuna bivalente liofilizada a virus activo que contiene la cepa Clone 30 del virus de la Enfermedad de Newcastle y la cepa Ma5 (serotipo Massachussets) del virus de la Bronquitis Infecciosa aviar. Elaborada en embriones de pollo SPF.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la Enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA:

NO ABRA NI MEZCLE LA VACUNA HASTA ESTAR LISTO PARA COMENZAR LA VACUNACIÓN. USE LA VACUNA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERLA RECONSTITUIDO.

1. Quite el sello y el tapón del frasco que contiene la vacuna.
2. Vierta agua fría y limpia (que no haya sido tratada con desinfectantes en los frascos de vacunas hasta llenar dos terceras partes de los mismos).
3. Tape el frasco con los tapones de hule y agítelo hasta que se disuelva la pastilla liofilizada.
4. Para la aplicación por aspersion o agua de bebida, vierta la vacuna rehidratada en los recipientes adecuados.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Depende de la prevalencia de las enfermedades de Newcastle y Bronquitis Infecciosa en la zona, granja o parvada.

Aplicar por aspersion con gota gruesa o en agua de bebida a partir de la primera semana de edad.

ASPERSION CON GOTA GRUESA

1. Prepare la vacuna como se indica en el punto anterior. Para la vacunación con gota gruesa siga las recomendaciones del fabricante de la aspersora en lo concerniente a la cantidad de agua a emplear según sus especificaciones. Por ejemplo, una máquina que administra 10 ml por caja de 100 pollos, el volumen total para 10,000 dosis es de 1000 ml. Mezclar completamente, use solamente agua fría destilada.
2. Agregar la solución con la vacuna al depósito de la aspersora. No use ningún desinfectante, detergente o leche descremada.
3. En el caso de pollos de 1 día de edad, coloque las cajas conteniendo 100 pollos c/u en la banda transportadora o en la aspersora o en el caso de aves mayores aspérlas caminando a través de la caseta.
4. En granjas, al vacunar por aspersion cierre las cortinas y apague todos los ventiladores; al finalizar la vacunación enciéndalos nuevamente y abra las cortinas. Tenga cuidado en tiempo de calor. Los trabajadores que lleven a cabo la aspersion deberán usar mascarilla para proteger el rostro.

ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL EN EL AGUA DE BEBIDA.

1. No use desinfectantes de ninguna clase en el agua de bebida durante las 48 horas previas a la vacunación y durante las 24 horas posteriores.
2. Se aconseja privar de agua a los animales durante algún tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas y edad de las aves) con el objeto de que tengan sed en el momento de aplicar la vacuna.
3. Lave y enjuague bien los bebederos con agua fría y limpia. No use desinfectantes ni detergentes para lavarlos.
4. Mezcle la vacuna rehidratada con agua fría y limpia de acuerdo a la tabla siguiente:

Edad de las aves (semanas)	Agua por cada 1000 dosis de vacuna
2 a 4	Hasta 9.5 litros
4 a 8	Hasta 19 litros
8 o mayores	Hasta 38 litros

Con el objeto de proteger el virus vacunal, se pueden agregar 100 gr de leche descremada en polvo por cada 38 litros de agua. Mezcle la leche antes de agregar la vacuna previamente hidratada.

5. Distribuya la solución en los bebederos de las aves. No exponga los bebederos a los rayos del sol.
6. No administre más agua hasta que no se haya consumido la totalidad de la vacuna.

ADVERTENCIAS:

- Consérvese a una temperatura entre 2 y 8°C.
- Vacunar solamente aves sanas.
- Todas las aves susceptibles en un mismo local deberán vacunarse en un solo manejo.
- La vacunación de gallinas de postura en producción con vacuna a virus activo Newcastle/Bronquitis puede no ser conveniente para ellas, no se recomienda en forma general. Consulte a los servicios técnicos de MSD para mayor información.

- No diluya ni aumente la dosis.
- Una vez reconstituida la vacuna utilice todo el contenido.
- El virus de Newcastle puede causar conjuntivitis en humanos. Evite el contacto con los ojos.
- Deseche el sobrante mediante incineración.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 frascos de 1000 dosis.
Caja con 10 frascos de 2000 dosis.
Caja con 10 frascos de 2500 dosis.
Caja con 10 frascos de 5000 dosis.
Caja con 10 frascos de 10 000 dosis.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5830 AA,
Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
www.msd-salud-animal.com.mx
Intervet Ecuador S.A. Registro 4A-3326-AGROCALIDAD
El Salvador Reg. No.: VE2017095331