



Resflor solución inyectable

### 1. COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Florfenicol	300.0 mg
Flunixin (como meglumina)	16.5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL.

### 2. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

### 3. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

### 4. INDICACIONES

En bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y su pirexia asociada causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis*.

### 5. DOSIS, MÉTODO Y RUTA DE ADMINISTRACIÓN

Para inyección subcutánea 40 mg/kg de florfenicol y 2.2 mg/kg flunixin (equivalente a 2 ml de solución/15 kg peso vivo) para ser administrado en una sola inyección por vía subcutánea. El volumen de la dosis aplicada en un solo lugar de inyección no debe exceder 10 ml. La inyección solo debe ser aplicada en el cuello.

### 6. ADVERTENCIAS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Desinfectar el tapón del frasco antes de extraer cada dosis. Use jeringas y agujas secas y estériles.

### 7. CONTRAINDICACIONES

No utilizar en toros adultos destinados a la reproducción. No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano. No utilizar en animales que sufren de enfermedades renales o hepáticas. No lo utilice si existe el riesgo de sangrado gastrointestinal o en los casos en que existen pruebas de la hemostasia alterada.

### 8. REACCIONES ADVERSAS

La administración subcutánea del producto puede provocar una inflamación en el sitio de aplicación, que se vuelve palpable de 2 a 3 días después de la inyección. La inflamación provocada por la inyección puede durar de 15 a 36 días después de la aplicación. Macroscópicamente esto se asocia con una leve irritación de la hipodermis. La extensión al músculo subyacente se observó sólo en unos pocos casos. Después de 56 días post-aplicación no se observaron lesiones macroscópicas que pudieran provocar algún decomiso al momento del sacrificio. Si observa

cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, consulte con su Médico Veterinario.

### 9. ADVERTENCIAS ESPECIALES

El producto debe ser usado junto con una prueba de sensibilidad y tomar en cuenta las políticas oficiales y locales del uso de antimicrobianos. El efecto del florfenicol en el rendimiento reproductivo y la gestación de los bovinos no ha sido evaluado. Utilice únicamente después de una evaluación de riesgo-beneficio efectuada por el veterinario responsable. Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un aumento en el riesgo potencial de toxicidad renal. La administración concomitante de fármacos potencialmente nefrotóxicos debe evitarse. El uso simultáneo de otras sustancias activas con un alto grado de unión a proteínas puede generar una competencia con flunixin por la unión y producir efectos tóxicos. El tratamiento previo con otras sustancias antiinflamatorias puede producir reacciones adversas adicionales o aumentadas, por consiguiente, un período libre de tratamiento con tales fármacos deben ser observado durante al menos 24 horas antes del inicio del tratamiento. El período libre de tratamiento, sin embargo, debe tener en cuenta las propiedades farmacocinéticas de los productos utilizados previamente. El producto no debe ser administrado en conjunto con otros AINE´s o glucocorticosteroides. La ulceración del tracto gastrointestinal puede ser exacerbada por los corticosteroides en animales que recibieron AINE´s. No use el producto en los casos conocidos de sensibilidad al propilén glicol y polietilén glicoles.

### 10. TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 46 días después de finalizado el tratamiento. No utilizar en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano ni en los 2 meses antes del parto.

### 11. CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAJE

Almacenar por debajo de 25 °C.  
Periodo de caducidad después de abierto el frasco: 28 días.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.

### USO VETERINARIO

Reg. ICA No. 9078 MV

Elaborado por: Vet Pharma Friesoythe GmbH, Alemania.

Importado por: Intervet Colombia Ltda.

Costa Rica: Reg. MAG No. DE-5-5-88-4204

Rep. Dominicana: Reg. No. 6302

Honduras: Reg. No. PF-4212

Panamá: Reg. No. RF-4213-08

El Salvador: Reg. VE2014094981

En Perú, Importado y distribuido por:

Intervet S.A.

Av. Republica de Panamá 3956, Surquillo, Lima.

RUC: 20372399687

Reg SENASA No. F.71.01.1.0077

Producto de Intervet Deutschland GmbH - Alemania.



**MSD**

Animal Health