MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® DAPPV + L4

USO VETERINARIO

VACUNA VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL MOQUILLO (DISTEMPER CANINO), ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA CON 4 CEPAS.

1

FÓRMULA:

Cada dosis de 1 ml contiene:

Fracción liofilizada (virus activos atenuados):

Virus del Distemper canino (CDV), cepa Distemperoid	≥ $10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV-2), cepa Ditchfield	≥ $10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Parainfluenza Canina (CPI), cepa CPI-PR	≥ $10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Parvovirus Canino (CPV), cepa SAH-CPV-2b	≥ $10^{5.1}$ $FAID_{50}$

Fracción líquida (inactivada)

Leptospira interrogans serovar:

Canicola, cepa LC-NY	≥ 80 hámster PD_{80}
Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403J	≥ 80 hámster PD_{80}
Pomona	≥ 80 hámster PD_{80}
Gryppotyphosa	≥ 80 hámster PD_{80}



PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis, acompañado por diluyente estéril.

INDICACIONES:

La vacuna **Nobivac® DAPPv** es una vacuna de virus vivos atenuados que es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del Distemper canino, adenovirus canino tipo 1 (hepatitis) y tipo 2, virus de la parainfluenza canina, y parvovirus canino.

Nobivac® L4 es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *L.* Canicola*, L.* Icterohaemorrhagiae*, L.* Pomona y *L.* Grippotyphosa; prevención la leptospiruria (eliminación de Leptospira en orina) causada por *L.* Canicola*, L.* Icterohaemorrhagiae, y *L.* Grippotyphosa; y como ayuda en la prevención de leptospiruria causada por *L.* Pomona.

ESPECIES DESTINO: Perros

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir, suspensión inyectable.

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® DAPPv+L4 es la combinación de una vacuna viva atenuada liofilizada (**Nobivac® DAPPv**) y una bacterina inactivada líquida.
(**Nobivac® L4**) utilizada como diluyente.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Agitar el vial de **Nobivac® L4** y transferir su contenido al vial de **Nobivac® DAPPv** de forma aséptica.
Mezclar suavemente hasta que esté disuelto.
Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación.
Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea.

MSD Animal Health

2

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Vacunación básica: La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir en intervalos de 2 – 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis es requerido para la inmunización primaria. Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una dosis.
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Utilice material estéril para la administración. No esterilizado químicamente. Evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna
REACCIONES ADVERSAS:
En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea puede ocurrir poco después de la vacunación. Tratamiento: Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos. Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.
Gestación, lactancia y fertilidad:
No vacunar hembras gestantes.
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELAR. Protéjase de la luz.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet Inc.,** **EE.UU.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.