MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® DAPPvL2
USO VETERINARIO

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA

1

FÓRMULA:	Cada dosis contiene: Virus vivos atenuados Virus de Distemler canino, cepa Distemperoide ≥ $10^{3.7}$ $TCID_{50}$ /dosis Adenovirus canino tipo 2, cepa Ditchfield ≥ $10^{4.8}$ $TCID_{50}$ /dosis Virus de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR ≥ $10^{4.3}$ $TCID_{50}$ /dosis Parvovirus canino, cepa SAH-CPV-2b ≥ $10^{5.1}$ $FAID_{50}$ /dosis Bacterina: *Leptospira* Canicola, cepa LC-NY ≥ 80 hamster PD_{80} *Leptospira* Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403 J ≥ 80 hamster PD_{80} Excipientes c.s.p. 1 ml
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis acompañado por diluyente estéril.
INDICACIONES:	Para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 (hepatitis), Adenovirus canino tipo 2 (enfermedad respiratoria), virus de Parainfluenza canina y Parvovirus canino; y contra la Leptospirosis causada por *L.* Canicola y *L.* Icterohaemorrhagiae.

ESPECIES DESTINO: Perros

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir suspensión inyectable

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® DAPPvL2 es una vacuna de virus vivos atenuados que se combina con una bacterina de *Leptospira* Canicola y *Leptospira* Icterohaemorrhagie

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Transfiera el contenido del vial de diluyente estéril al vial de **Nobivac® DAPPvL2** de forma aséptica.
Mezclar suavemente hasta que se reconstituya.
Inmediatamente después de rehidratar, use todo el contenido.
Inyecte una dosis (1 ml) subcutáneamente o intramuscularmente.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La primovacunación deberá realizarse en cachorros de seis semanas de edad o mayores, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas o tres meses de edad.
Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
Utilice material estéril para la administración.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

MSD Animal Health

2

REACCIONES ADVERSAS:
Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación, utilizar como tratamiento epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción. .
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos, sin signos clínicos de enfermedad y desparasitados. Contiene gentamicina y timerosal como conservadores. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.
Gestación, lactancia y fertilidad:
No vacunar hembras gestantes, ni lactantes.
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet Inc.** **EE.UU.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@msd.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.