MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® DAPPvL2 + Cv

USO VETERINARIO

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER (MOQUILLO), ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS, CORONAVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA

1

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus vivo atenuado contra:

Distemper canino, cepa Distemperoide	≥$10^{3.7}$ $TCID_{50}$
Adenovirus canino tipo 2, cepa Ditchfield	≥$10^{4.8}$ $TCID_{50}$
Parainfluenza canina, cepa CPI-PR	≥$10^{4.3}$ $TCID_{50}$
Parvovirus canino, cepa SAH-CPV-2b	≥$10^{5.1}$ $FAID_{50}$

Bacternina:

Leptospira Canicola, cepa LC-NY	≥8/10 sobrevivientes post-desafío
L. Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403 J	≥8/10 sobrevivientes post-desafío

Fracción líquida

Virus inactivado de Coronavirus entérico felino, cepa WSU 79-1683(3)	≥1 RP

Excipientes c.s.p. 1 ml

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja con 25 unidades de frasco vial con liofilizado (**Nobivac® DAPPvL2**) y 25 unidades como diluyente (**Nobivac® Cv**).

INDICACIONES: Para la inmunización de perros sanos de seis semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención y control del Distemper canino, Adenovirus tipo 1 y 2, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis y Coronavirus canino.

ESPECIES DESTINO: Perros

FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable para reconstituir; Nobivac® Cv como diluyente y Nobivac® DAPPvL2 como polvo liofilizado.

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® DAPPvL2 es una vacuna de virus vivos atenuados que se combina con una bacterina de *Leptospira* Canicola y *Leptospira* Icterohaemorrhagie para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 (hepatitis), Adenovirus canino tipo 2 (enfermedad respiratoria), virus de Parainfluenza canina y Parvovirus canino; y contra la Leptospirosis causada por *L.* Canicola y *L.* Icterohaemorrhagiae.

Nobivac® Cv (Coronavirus entérico felino) es una vacuna de virus inactivado para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de la enfermedad causada por la infección del Coronavirus entérico canino. El Coronavirus ha sido inactivado químicamente y combinado con un adyuvante diseñado para mejorar la respuesta inmunológica.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Agite el vial de **Nobivac® Cv** y transfiera su contenido al vial de **Nobivac® DAPPvL2**, asépticamente.
Mezcle cuidadosamente hasta que se reconstituya. Inmediatamente después de rehidratar, use todo el contenido.
Inyecte una dosis (1 ml) subcutánea o intramuscular.

MSD Animal Health

2

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
La dosis inicial puede administrarse a las 6 semanas de edad o más. Repita la dosis a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Se requieren como mínimo dos dosis para la inmunización primaria. Se recomiendan revacunaciones anuales con una dosis.
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Utilice material estéril para la administración.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna
REACCIONES ADVERSAS:
Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación, utilizar como tratamiento epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos, sin signos clínicos de enfermedad y desparasitados. Contiene gentamicina y timerosal como conservadores. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.
Gestación, lactancia y fertilidad: *No vacunar hembras gestantes, ni lactantes.*
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet Inc.** **EE.UU.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@msd.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.