MSD Animal Health

1

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® HCP
USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Herpesvirus felino (HVF), Cepa 593-J	≥ $10^{4.7}$ PFU
	Calicivirus Felino (FCV) Cepa 894-T	≥ $10^{3.1}$ PFU
	Virus de Panleucopenia Felina (FPL) Cepa Philips Roxane	≥ $10^{3.0}$ $FAID_{50}$
	Excipientes c.s.p. 1 dosis (1 ml)	
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis acompañado por diluyente estéril.	
INDICACIONES:	Para la vacunación de gatos sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por Herpesvirus (rinotraqueítis), Calicivirus y Panleucopenia felina.	

ESPECIES DESTINO: Gatos

FORMA FARMACÉUTICA: Liofilizado y solvente en suspensión inyectable.

INDICACIONES DE USO:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de enfermedades felinas causadas por los virus de la Rinotraqueitis infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina, Nobivac® HCP está indicada como una ayuda en la prevención de enfermedades felinas causadas por los virus de la Rinotraqueítis infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina, en gatos sanos a partir de las 9 semanas de edad.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna para gatos contra Herpesvirus (Rinotraqueítis), Calicivirus y Panleucopenia felina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Dos dosis son necesarias para la inmunización primaria.
Vacunación inicial: Inyectar 1 dosis (1 ml) por vía subcutánea o Intramuscularmente a las 9 semanas de edad o más.
Segunda vacunación: Inyectar 1 dosis (1 ml) por vía subcutánea o Intramuscularmente 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial.
Revacunar cada año con una sola dosis de **NOBIVAC® HCP.**
Disolver la vacuna **NOBIVAC® HCP** con el diluyente **Nobivac® Solvent** asépticamente.
Mezclar suavemente hasta disolver el liofilizado.
Utilice todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

• Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
• Utilice material estéril para la administración.
• Evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

CONTRAINDICACIONES:

No tiene.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son auto limitadas en la mayoría de los casos. Utilizar como tratamiento epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos. Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.
Gestación, lactancia y fertilidad:
No vacunar hembras gestantes, ni lactantes.
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet Inc.** **EE.UU.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@msd.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.