MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® INTRA-TRAC ORAL

USO VETERINARIO

VACUNA LIOFILIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA CAUSADA POR *Bordetella bronchiseptica.*

FÓRMULA:	**Cada dosis contiene:** ***Bordetella bronchiseptica,* cepa B-C2 1 X 10^9 UFC** **Vehículo c.b.p. 1 dosis**
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	**Caja con 25 frascos de una dosis.**
INDICACIONES:	**Para la vacunación de cachorros y perros adultos sanos como ayuda en la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras") causada por *Bordetella bronchiseptica*.**
ESPECIES DESTINO: Perros	

FORMA FARMACÉUTICA: Liofilizado y solvente en suspensión oral

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® Intra-Trac Oral Bb es una vacuna para administración oral, contiene cultivo vivo atenuado de *Bordetella bronchiseptica*. La vacuna se presenta en forma liofilizada junto con diluente estéril.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía oral.
Preparación de la vacuna:
Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente estéril proporcionado.
Retirar la aguja y administrar 1 ml por vía oral en la cavidad bucal.
Utilizar inmediatamente después de la rehidratación.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aplicar una sola dosis vía oral en cachorros sanos de 7 semanas de edad o mayores.
Se recomienda la revacunación anual.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

• Sólo deberán vacunarse animales sanos y desparasitados.
• Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.

CONTRAINDICACIONES:

No tiene.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas. Administrar epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:
No se ha establecido la seguridad del producto durante la gestación.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente a etiqueta del producto.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.
www.msd-salud-animal.com.pa

MSD Animal Health

2

Precauciones de Almacenamiento:
Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C. NO CONGELAR.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet Inc.** **EE.UU**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.