MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® KC
USO VETERINARIO

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA (TOS DE LAS PERRERAS)

FÓRMULA:	Cada dosis contiene *Bordetella Bronchiseptica*, cepa B-C2 ≥$10^{8.3}$ CFU Virus de la Parainfluenza canina, cepa Cornell ≥$10^{3.8}$ $TCDI^{50}$ Vehículo c.b.p. 1 dosis
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 5 frascos de 1 dosis cada uno, con diluente.
INDICACIONES:	Para la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras") debida a la infección por el virus de la Parainfluenza canina y *Bordetella Bronchiseptica*.

ESPECIES DESTINO: Perros

FORMA FARMACÉUTICA: Vacuna liofilizada con diluyente.

DESCRIPCIÓN:

Es una vacuna modificada de aplicación intranasal que contiene el virus atenuado de la Parainfluenza canina, cepa Cornell y un cultivo avirulento de *Bordetella Bronchiseptica*, cepa B-C2. Se presenta en forma liofilizada con diluente estéril para su reconstitución.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se aplica por vía intranasal en cachorros y perros adultos sanos.
Reconstituya en forma aséptica la vacuna con el diluente adjunto.
Retire la aguja y administre 0.4 ml en un orificio nasal. Debido al volumen reducido de la vacuna, no se requiere de un hisopo aplicador para administrarla.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Los cachorros sanos, a partir de las tres semanas de edad, y los perros, deben ser vacunados por lo menos 72 horas antes del confinamiento o cuando pudiera existir el riesgo de infección por TIC.
Revacunar anualmente.
La vacunación con **Nobivac® KC** estimula una respuesta inmune local y rápida en el tracto respiratorio, por lo tanto, inhibe la infección en el sitio de entrada y previene la aparición de signos clínicos. La protección contra *Bordetella Bronchiseptica* después de la vacunación ocurre a las 72 horas post-vacunación. Además de la respuesta inmune local, también estimula una inmunidad sistémica vs Parainfluenza canina dentro de las tres semanas posteriores a su aplicación intranasal. El pequeño volumen para administrar (0.4 ml), así como la vía de administración intranasal, permiten una fácil aplicación especialmente en los cachorros jóvenes de razas pequeñas.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos.
- Utilice material estéril para la administración.
- No deben utilizarse jeringas o agujas esterilizadas químicamente para la aplicación de la vacuna.
- Agite bien antes de usar.
- La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.
www.msd-salud-animal.com.pa

MSD Animal Health

2

REACCIONES ADVERSAS:
No se presentaron reacciones post-vacunales en el 99.7% de los animales tratados. En caso de reacción anafiláctica, epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos. Los animales que incuban alguna enfermedad, o animales bajo condiciones de estrés debido al transporte, malnutrición o parasitosis podrían no presentar ni mantener una inmunidad adecuada. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.
Gestación, lactancia y fertilidad:
Se pueden vacunar hembras gestantes
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. No congele.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet International BV.** **Países Bajos.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@msd.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.