MSD Animal Health

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® PUPPY DP PLUS
USO VETERINARIO

1

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN	
FÓRMULA:	**Cada dosis (1 mL) de vacuna reconstituida contiene:** **Sustancias activas:** **Distemper canino vivo atenuado, cepa Onderstepoort: ≥ $10^{5.1}$ $TCID_{50}$*** **Parvovirus canino vivo atenuado (recombinante) 630a: ≥ 105.1 TCID50*** *** Dosis infecciosa de cultivo tisular 50%**
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	**Cajas de cartón de 5 viales de dosis única.** **Cajas de plástico transparente de 5 viales de dosis única.**
INDICACIONES:	Para la inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad o más para prevenir los signos clínicos y la mortalidad de la infección por virus de moquillo canino y la infección por parvovirus canino y para prevenir la excreción viral después de la infección por virus de moquillo canino y después de la infección por parvovirus canino.

ESPECIES DESTINO:

Perros

FORMA FARMACÉUTICA:

Polvo liofilizado.

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® Puppy DP PLUS es una vacuna viva atenuada, diseñada para proteger a cachorros desde temprana edad y aún en presencia de títulos de anticuerpos maternales. Contiene la cepa de Distemper canino Onderstepoort con alta potencia (equivalente a 10 dosis de Distemper) que permite proteger a un mayor porcentaje de cachorros en tan sólo 7 días; también contiene la nueva cepa de Parvovirus canino 630a, elaborada mediante la recombinación de la cepa PVC2 154 y PVC2c (quimera), que le permite proteger al 100% de cachorros contra PVC en tan sólo 3 días además evita la excreción de PVC post desafío.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar una dosis a cachorros a partir de las 4 semanas de edad o más, como la primera vacuna del esquema de vacunación de cualquier cachorro.

Reconstituir un vial de dosis única que contenga liofilizado con el solvente suministrado.

Administrar el contenido total del vial.

Asegurarse de que el liofilizado esté completamente reconstituido antes de su uso.

Producto reconstituido: suspensión rosa o rosada.

CONTRAINDICACIONES:

La seguridad del producto no ha sido evaluada en Gestación, Lactancia y Reproducción. Por lo tanto, no se recomienda su uso en esta etapas de la vida.

MSD Animal Health

2

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:
Precauciones especiales para su uso en animales. El uso de un biológico puede producir anafilaxis y/u otras reacciones de hipersensibilidad inflamatoria inmune mediado. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. En algunos cachorros, la cepa de la vacuna contra el parvovirus canino se puede encontrar en las heces hasta 8 días después de la vacunación. Ocasionalmente este virus se puede propagar a otros perros, pero sin causar signos clínicos de la enfermedad. El virus de moquillo canino no se propaga por los cachorros vacunados. Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales.
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.
Precauciones de Almacenamiento:
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR: **Intervet International BV.** **Países Bajos.**	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL** **Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.