

INSTRUCCIONES PARA SU USO, LEA CUIDADOSAMENTE

VACUNA CONTRA LA VIRUELA AVIAR

Virus Vivo

AVA-POX™ CE

COMPOSICIÓN

Vacuna a virus vivo. Una vez reconstituida contiene no menos de $10^{2.4}$ EID₅₀ de virus de Viruela Aviar por dosis. Excip. c.s.

INDICACIONES PARA EL USO

Se recomienda aplicar esta vacuna en la membrana del ala en pollos sanos y mediante la punción en el muslo de pavos sanos de 8 a 18 semanas de edad. Una vez abierto, se debe utilizar todo el contenido de cada vial.

DESCRIPCION

La Vacuna contra la Viruela Aviar se prepara a partir de una cepa del virus de la Viruela Aviar que posee la propiedad de asegurar una buena reacción y otorgar inmunidad a pollos y pavos de 8 a 18 semanas de edad cuando se aplica en la membrana de los pollos y en el muslo de los pavos. Esta vacuna antivariólica es una vacuna de elección para las aves que se reservan como ponedoras.

REHIDRATACION DE LA VACUNA

NO ABRIR NI MEZCLAR LA VACUNA HASTA ESTAR COMPLETAMENTE PREPARADO PARA INICIAR LA VACUNACION. UTILIZAR LA VACUNA INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU PREPARACION.

1. Desprender el precinto de aluminio del vial que contiene la vacuna seca.
2. Quitar el tapón de goma.
3. Quitar el precinto de aluminio del vial del diluyente.
4. Verter una pequeña cantidad del diluyente en el vial de la vacuna seca.
5. Reubicar el tapón de goma y agitar.
6. Verter la vacuna disuelta en el frasco que contiene el resto del diluyente.
7. Reubicar el tapón de goma y agitar vigorosamente hasta que todo el material se haya disuelto.

APLICACION EN LA MEMBRANA DEL ALA DE LOS POLLOS

1. Rehidratar la vacuna según las indicaciones precedentes. No separar ninguna de las agujas del aplicador.
2. Sostener el pollo y desplegar la cara inferior de una de las alas hacia afuera.
3. Hundir el aplicador en el frasco que contiene la vacuna, mojando ambas agujas.
4. Punzar la membrana del ala expuesta con el aplicador cargado.
5. Volver a hundir el aplicador en el frasco que contiene la vacuna y proceder con el pollo siguiente.
6. Evite punzar los vasos sanguíneos, los huesos y el músculo del ala.
7. Cuidese de no tocar con la vacuna ninguna zona del cuerpo del ave que no sea el sitio de inoculación.
8. Examine y registre las reacciones (la reacción forma un pequeño bulto en la zona de la vacunación) 7 a 10 días luego de la fecha de vacunación. Las reacciones generalmente desaparecen al cabo de 2 semanas después de dicha fecha.

APLICACION EN EL MUSLO DE LOS PAVOS

Esta vacuna se puede aplicar mediante el método de punción del muslo del siguiente modo:

1. Rehidratar la vacuna según las indicaciones precedentes. No separar las agujas del aplicador.
2. Mientras un asistente sostiene las patas del pavo con una mano y mantiene la cabeza del ave hacia abajo con la espalda girada hacia él mismo, pasa la otra mano hacia abajo en la región externa del muslo, retirando las plumas y exponiendo un sitio pelado.
3. El vacunador hunde el aplicador en el frasco que contiene la vacuna y se aplica la punción en los músculos del muslo.
4. Se debe evitar la punción de los tendones, pero es necesario penetrar con suficiente profundidad como para traspasar la piel e inocular la vacuna.
5. Volver a hundir el aplicador en el frasco que contiene la vacuna y proceder con el ave siguiente.
6. Cuidese de no tocar con la vacuna ninguna zona del cuerpo del ave que no sea el sitio de inoculación.
7. Examine y registre las reacciones (se forma un pequeño bulto en el sitio de la vacunación) 7 a 10 días luego de la fecha de vacunación. Por lo general, las reacciones suelen desaparecer al cabo de 2 semanas después de dicha fecha.

PRECAUCIONES

Solamente se deben vacunar las aves sanas. Consulte con su patólogo avícola respecto de otras recomendaciones basadas en las condiciones específicas que correspondan a su zona en determinadas situaciones particulares. Las aves no se deberán ubicar en sectores contaminados. Se debe evitar la exposición inmediatamente después de la vacunación, dado que el desarrollo de la resistencia lleva hasta 10 días. Todas las aves susceptibles de un mismo establecimiento deben ser vacunadas al mismo tiempo. En caso de que ello no fuera posible, entonces será necesario considerar la segregación y la contratación de cuidadores separados para las aves no vacunadas. Se deberán tomar las máximas precauciones para reducir las condiciones de estrés durante el período de vacunación.

Almacenar entre 2° y 7°C. Para la disposición final, se deben eliminar todos los envases según la regulación vigente. Esta vacuna no se debe aplicar dentro del período de los 21 días anteriores a la fecha de faena. Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservante. El potencial de esta vacuna de alcanzar resultados satisfactorios depende de numerosos factores, incluyendo, a título ilustrativo pero no limitativo, las condiciones de conservación y el manejo por parte del usuario, la administración de la vacuna, el estado sanitario y de sensibilidad reactiva de los animales en cuestión y el grado de exposición de campo. Por consiguiente, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones impartidas para el uso.

REGISTROS

Mantener un registro de la vacuna, cantidad, número de serie, fecha de vencimiento y lugar de la compra, fecha y hora de la vacunación, el número, edad raza y ubicación de las aves y nombres de los operarios que administraron la vacuna y cualquier reacción observada.

USO VETERINARIO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Fabricado por:

Intervet Inc.
Omaha, NE 68103, USA
VLN/PCN 165A/1621.14

Importado y distribuido por:

Argentina: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841 piso 4
Munro, Vicente López (B1605AZE), Argentina.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez MPBA 4505
■ SENASA CERT. N° 90.179
Establecimiento inscripto N° 11.792
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta.

Venezuela:

Importado y distribuido en Venezuela por:
Intervet Venezolana S.A RIF J-30327783-7
Registro M.A.T - SASA: B.I 6.092
CPE: 0807136613
Asesor Técnico: Alba Codutti
Solo para uso Veterinario
Manténgase alejado del alcance de los niños.
Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario
Uruguay: Reg No. A-4930
Rep. Dominicana Reg. No.: 2108
Panamá Reg. No.: RF-178-13

150618-01