

Vacuna Contra La Enfermedad Bursal

PRECAUCIÓN: ÚSELO SOLO EN LOS ESTADOS DONDE ESTÁ PERMITIDA Y EN POLLOS UBICADOS EN LUGARES CON UN HISTORIAL DE ENFERMEDAD BURSAL INFECCIOSA.

Las regulaciones federales prohíben que se re-empaquen o la venta del contenido de este paquete en unidades fraccionales. NO LO ACEPTE SI EL SELLO ESTÁ ROTO.

Schering-Plough Animal Health, Millsboro, de19966 E.E.U.U.
Lic. Vet. de E.E.U.U. No. 226

CONTENIDO NETO:

1.000 10.000

VIRUS VIVO

ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBER

BURSA-VAC®

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Use todo el contenido al abrirlo la primera vez. No vacune en los 21 días anteriores al sacrificio. Almacene la vacuna bajo refrigeración por debajo de 45° F (7° C). Se añade Gentamicina como preservante.
PRECAUCIÓN: Queme los recipientes y cualquier porción no empleada.

DESCRIPCIÓN

Esta vacuna contiene una cepa atenuada del virus de la enfermedad bursal infecciosa (IBD). Cuando se administra adecuadamente a pollos sanos, susceptibles, esta vacuna se emplea como ayuda en la prevención de la Enfermedad Bursal.

INDICACIONES DE USO

Esta vacuna está recomendada para la vacunación de pollos sanos entre 7 y 14 días de edad en lugares como un historial de infección IBD. Sin embargo, si los pollos son de padres inmunes, debe demorarse la vacunación, hasta que tenga al menos 10 días de edad, para obtener la mejor protección.

Unos pocos pollos vacunados generalmente desarrollarán síntomas, o sea, depresión, anorexia y diarrea y ocasionalmente pueden morir pollos con las lesiones típicas. En la mayoría de los casos la mortandad total en las bandadas vacunadas es menor al 1%.

Las observaciones en el campo indican que los brotes naturales de IBD en bandadas sin vacunar producen aproximadamente un 3% de mortandad, con la producción de numerosos animales de desecho.

PRECAUCIONES

Vacune sólo a los pollos sanos. Consulte a su patólogo avícola para recomendaciones adicionales basadas en las condiciones existentes en su área en un momento dado. Todos los pollos susceptibles en las mismas instalaciones deben ser vacunados al mismo tiempo.

Si esto no es posible, entonces debe haber un aislamiento estricto y deben emplearse cuidadosamente diferentes para las unidades no vacunadas. Deben realizarse esfuerzos para reducir las condiciones de estrés al momento de administrar la vacuna.

ADVERTENCIA

Deben tomarse medidas para evitar la diseminación del virus de las bandadas vacunadas a alas instalaciones limpias.

REHIDRATACIÓN DE LA VACUNA

- Quite el sellos de aluminio del frasco que contiene la vacuna seca.
- Saque el tapón de goma.
- Coloque agua limpia sin cloro cuidadosamente en el frasco de la vacuna hasta que esté aproximadamente 2/3 lleno.
- Vuelva a colocar el tapón de goma y agite vigorosamente hasta que todo el material se disuelva.
- La vacuna está lista para usarse de acuerdo con las instrucciones a continuación.

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DE BEBER

Para la vacunación de pollos sanos de 7 a 14 días de edad mediante administración en el agua de beber.

- Remueva cualquier mediación, limpiadores o desinfectantes del agua de beber, preferiblemente 72 horas antes de la vacunación y por 24 horas después de la misma.
- Proporcione suficiente espacio para que al menos 2/3 de los pollos puedan beber al mismo tiempo.
- Lave los aguadores bien y enjuáguelos con agua fresca y limpia.
- Retenga el agua 2 horas antes de la vacunación para estimular la sed.
- Rehidrate la vacuna según como se especifica anteriormente.
- Añada vacuna rehidratada a la relación de 1 • galones (5.7 litros) por 1000 dosis a agua limpia sin cloro.
- Distribuya la solución de vacunación, ya preparada, entre los aguadores provistos para el pollo. Evite colocar la vacuna directamente al sol.
- No proporcione mas agua de beber hasta que toda el agua con vacuna haya sido consumida.

Edad de los pollos	Agua por 1000 dosis
7-14 días	1,5 gal. (5.7 litros)
2-4 semanas	2,5 gal. (9.5 litros)
4-8 semanas	5 gal. (19 litros)
Más de 8 semanas	10 gal. (38 litros)

PRECAUCIÓN

La capacidad de esta vacuna para producir resultados satisfactorios depende de muchos factores, incluyendo, pero no limitándose a las condiciones de almacenamiento y manejo por el usuario, administración de la vacuna, la salud y respuesta de los animales individuales y el grado de exposición en el campo. Por lo tanto, las instrucciones de uso deben ser seguidas cuidadosamente.

El uso de esta vacuna está sujeto a los estados donde está permitida y a las leyes y regulaciones federales.

ALMACENE LA VACUNA BAJO REFRIGERACIÓN ENTRE 4°-7°C

Costa Rica Reg. MAG US27-65-69-2541

LOTE:

FECHA DE MANUF.:

VENCE:



MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS Y PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR