



COBACTAN

Reg. SAGARPA Q-0273-127

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN:

Cobactan® es una suspensión lista para administración parenteral.

FORMULA:

Cada ml contiene:

Cefquinome..... 25 mg

Vehículo c.b.p..... 1 ml

INDICACIONES:

Cefquinome es la primera cefalosporina de 4ª generación con un amplio espectro de actividad en infecciones del ganado bovino y porcino. Se caracteriza por poseer una gran estabilidad hacia las penicilinasas y betalactamasas. Cefquinome se absorbe rápidamente alcanzando niveles séricos terapéuticos en sólo unos minutos. En bovinos y porcinos está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a Cefquinome.

ESPECTRO DE ACCIÓN:

- Gram negativos: Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Escherichia coli, Proteus spp., Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacteriaceae, Citrobacter, Serratia marcescens.
- Gram positivos: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Actinomyces pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp. Clostridium spp.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Especies	Indicación	Dosis	Frecuencia
Bovinos (carne y leche)	Enfermedad respiratoria causada por P. multocida y M. haemolytica	1 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml/50 kg de peso)	Diaria durante 3 -5 días consecutivos
	Dermatitis digital, necrosis bulbar infecciosa, necrobacilosis digital aguda (abscesos plantares)	1 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml/50 kg de peso)	Diaria durante 3 -5 días consecutivos
	Mastitis aguda por E. Coli con signos de compromiso sistémico	1 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml/50 kg de peso)	Diaria por 2 días consecutivos
Terneros	Septicemia por E. Coli	2 mg Cefquinome / kg de peso (4 ml/50 kg de peso)	Diaria durante 3 -5 días consecutivos
Cerdos	Enfermedad respiratoria	2 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml por 25 kg de peso)	Diaria por 3 días consecutivos
	Síndrome M.M.A.	2 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml por 25 kg de peso)	Diaria por 2 días consecutivos

Lechones	Meningitis	2 mg Cefquinome / kg de peso (2 ml por 25 kg de peso)	Diaria por 5 días consecutivos
	Artritis	2 mg Cefquinoma / kg de peso (2 mL por 25 kg de peso)	Diaria por 5 días consecutivos
	Epidermitis	2 mg Cefquinoma / kg de peso (2 mL por 25 kg de peso)	Diaria por 5 días consecutivos

CONTRAINDICACIONES:

La hipersensibilidad a las cefalosporinas es poco frecuente, sin embargo®Cobactan no debe administrarse a animales que hayan presentado hipersensibilidad a los antibióticos betalactámicos.

PRECAUCIONES GENERALES:

La aplicación de este producto puede causar una reacción tisular localizada que desaparece por sí sola al cabo de unos días. Si el operador es hipersensible a los antibióticos betalactámicos debe manejar este producto con precaución ya que puede ocasionarle una reacción alérgica.

ADVERTENCIAS:

Agítese antes de usar.

Limpie el tapón antes de tomar cada dosis. Utilice jeringas y agujas estériles.

Este producto no contiene conservadores antimicrobianos.

Tras extraer las primeras dosis, el contenido restante debe ser empleado durante las 4 semanas siguientes.

Desechar el material no utilizado después de este período.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Período de retiro:

Bovinos:

Carne: 5 días

Leche: 24 horas

Cerdos:

Carne: 3 días

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

No requiere refrigeración.

Consérvese en lugar fresco y seco protegido de los rayos solares.

PRESENTACIONES:

Frascos con 50 y 100 ml.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ELABORADO POR:

Intervet International GmbH
Feldstraße 1ª 85716
Unterschleißheim, Alemania.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo No. 369, Colonia La
Otra Banda, C.P. 01090, Delegación
Álvaro Obregón, Ciudad de México
www.msd-salud-animal.com.mx