

COCCIVAC™-B

Suspensión oral

Vacuna viva contra Coccidiosis Aviar
 producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria*
maxima, *Eimeria mivati* y *Eimeria tenella*.

USO VETERINARIO

Lea completamente las indicaciones antes de usar la vacuna

Composición:

Cada dosis del producto contiene:

<i>Eimeria acervulina</i> , cepa 90152-006	≥ 600 ooquistes
<i>Eimeria maxima</i> , cepa 90152-008	≥ 200 ooquistes
<i>Eimeria mivati</i> , cepa 90152-13	≥ 400 ooquistes
<i>Eimeria tenella</i> , cepa 90152-007	≥ 200 ooquistes
Excipientes c.s.p.	1 dosis

Como vacunar:

Administración por rociado en el alimento:

(para vacunación de pollos entre 1 – 3 días de edad)

1. No use ningún agua de bebida medicada o agua con desinfectante 24 horas antes y después de la vacunación o durante la vacunación.
2. Coloque alimento sobre un papel, debajo de las líneas de alimentación, para aumentar la exposición de los pollos a la vacuna.
3. Diluir la vacuna a una razón de 1000 dosis/400 ml de agua sin cloro. Mezclar bien y colocar en un envase limpio tipo rociador a presión.
4. Rociar la vacuna diluida sobre la superficie del alimento. Agitar el rociador durante la administración.
5. Para un mejor resultado, la vacuna debe ser rociada sobre todo el alimento.
6. Evitar mojar el alimento. Una aplicación apropiada será sólo humedecer la superficie del alimento.
7. Permita a los pollos el suficiente tiempo para ingerir los ooquistes sobre el alimento antes de colocar más alimento en el platillo o sobre el papel.

Administración en el agua de bebida:

(para vacunación de pollos entre 4 – 14 días de edad)

1. Discontinúe el uso de cualquier agua de bebida medicada o con desinfectantes 24 horas antes y después de la vacunación, y durante la vacunación.
2. Enjuague profusamente los bebederos sólo con agua limpia. No use agentes limpiadores o desinfectantes en este momento. Asegúrese de haber proporcionado los suficientes bebederos para permitir a todos los pollos beber al mismo tiempo.
3. Los pollos deben estar ligeramente sedientos de agua para alentarlos luego a beber cuando sea administrada la vacuna. La idea es hacer que ellos estén sedientos sin causarles estrés. Remover todos los bebederos desde los corrales y mantenerlos retirados como se indica a continuación. Durante la época de calor – desde 2-4 horas, pero no más de 4 horas. Durante la época fría – desde 4-6 horas.
4. Colocar 10 litros de agua de beber dentro de un balde por cada 1000 dosis de vacuna.
5. Ponga el agente de suspensión dentro del agua y agite. Permita un reposo por 1-2 minutos y luego mezcle bien.
6. Abra el frasco de la vacuna y vierta el contenido dentro del agua con el agente de suspensión mezclado. Enjuague el frasco de vacuna con la mezcla y agite vigorosamente.
7. Coloque bebederos en todos los ruedos de crianza para que la totalidad de los pollos puedan beber el agua y comiencen a estar vacunados.
8. Mantenga el agua con la vacuna enfrente de los pollos hasta que sea consumida.

Administración en cabina de rociado (Spray cabinet):

(Para vacunación de pollos de un día de edad.)

1. Use la vacuna diluida como se indica para cada máquina de vacunación por rociado. Cuando use un gabinete de rociado SPAH, nosotros recomendamos una dilución de 1000 dosis en 210 ml.
2. Agregue la solución de vacuna al reservorio presurizado del aparato rociador.
3. Prepare y ajuste la máquina como se indica en el manual de operaciones de la máquina.
4. Localice las cajas con 100 pollos cada vez en la correa transportadora o en la máquina. Active la cabeza rociadora.
5. Usando una máquina SPAH, cada caja de 100 pollos recibe 21 ml de la solución de vacuna.

Precauciones especiales de uso:

- Vacúnese solamente aves sanas.
- La vacuna puede ser administrada en el agua de bebida entre 4-14 días de edad (preferiblemente a los 10 días). El alimento con la vacuna entre 1-3 días de edad; o mediante el rocío ocular o cabina de rociado al día de edad.
- Los pollos deben tener acceso a sus deposiciones cuando es requerido para darles inmunidad. Por lo tanto, los pollos criados sobre papel, o mantenidos en baterías o sobre alambre, deben ser colocados sobre el piso no más tarde que al cuarto día post vacunación.
- La humedad es necesaria para que esporulen los ooquistes.
- Use completamente el contenido de cada frasco una vez abierto.
- No se diluya la vacuna ni se reduzca la dosis de manera alguna.

Precauciones especiales para el operador:

Lavar y desinfectar las manos y material después de la vacunación.

Utilizar guantes al momento de preparar y administrar la vacuna a los animales. Si se administra mediante rociado, los operadores deben portar mascarillas bien ajustadas y anteojos protectores. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Período de resguardo:

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 2° y 7°C. No congelar.

Contraindicaciones:

No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostato. Incluso bajas dosis de coccidiostatos en el agua o en el alimento, puede reducir o impedir la inmunidad proporcionada por la vacuna. No administrar antimicrobianos de amplio espectro (Tetraciclinas y Sulfas) durante los primeros 15 días post aplicación de la vacuna.

Presentación:

Estuche conteniendo 10 frascos x 1000 y 10 frascos x 10000 dosis cada uno.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Los envases vacíos y parcialmente usados deben ser incinerados.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

VENTA BAJO RECETA/PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO

Fabricado por:

Intervet Inc.
411 West Delaware Ave
Millsboro, Delaware 19966, USA
Licencia Vet de EE.UU. No. 185A

Importado y distribuido por:

Argentina: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841 piso 4
Munro, Vicente López (B1605AZE), Argentina.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez MPBA 4505
■ SENASA CERT. N° 97.318

Establecimiento inscripto N° 11.792
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800.333.0160

Chile: Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8
Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.
Reg. SAG N°1285-B

Colombia: Intervet Colombia Ltda.
Bogotá D.C. – Tel: (1) 592 5050
Registro ICA No.: 7488 BV

México: Intervet México S.A. de C.V.
Consulte al Médico Veterinario
Reg. SAGARPA N° B-0273-218
Av. Paseo de los Frailes No. 22
Parque Industrial Santiago Tianguistenco
C.P. 52600 Estado de México.
www.msd-salud-animal.com.mx

Perú: Intervet S.A.

Av. República de Panamá 3956
Surquillo - Lima
RUC: 20372399687
Reg SENASA: B.017.011.0691

Venezuela:

Importado y distribuido en Venezuela por:
Intervet Venezolana S.A. RIF J-30327783-7
Registro M.A.T. - SASA: B.17.306
Asesor Técnico: Alba Codutti
Solo para uso Veterinario
Mantengase Fuera del Alcance de los Niños
Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario

Paraguay: Reg. N° 4363

Uruguay: Reg. N° A-1221

Costa Rica Reg. No.: US27-85-72-1485

Rep. Dominicana Reg. No.: 2103

Honduras Reg. No.: PB-422

Panamá Reg. No.: RB-190-14

El Salvador Reg No:

Distribuido en el Salvador por: