

CHORULON®

Reg. SAGARPA Q-0273-066**USO VETERINARIO****DESCRIPCIÓN Y FÓRMULA:**

Chorulon® se presenta en forma de pastilla liofilizada, blanca, cristalina conteniendo 500, 1500 ó 5000 UI de gonadotropina coriónica por vial, acompañada del diluyente correspondiente.

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución inyectable.

ACCIÓN:

Chorulon® (gonadotropina coriónica) es una glucoproteína compleja capaz de suplementar y sustituir la hormona luteinizante segregada por la glándula pituitaria anterior tanto en el macho como en la hembra. En la hembra Chorulon® promueve la maduración del folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En el macho Chorulon® estimula la producción de testosterona y de esta forma influye sobre el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales primarios y secundarios.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACION:

Especie	Indicaciones	Dosis y administración
Bovinos (Vacas y novillas)	<ul style="list-style-type: none"> Mejora la tasa de concepción Tratamiento de quistes foliculares 	<ul style="list-style-type: none"> 1 500 U.I., i.m o i.v. en el momento de la I.A. / monta y / o 4 a 6 días posteriores. 3000 U.I., i.v.
Cerdos (Cerdas adultas y primerizas)	<ul style="list-style-type: none"> Inducción y sincronización de la ovulación. 	<ul style="list-style-type: none"> 500 U.I., i.m. 24 horas antes o al momento de la I.A. / monta.
Caballos (Yegua)	<ul style="list-style-type: none"> Inducción de la ovulación (folículos \geq 3.5 cm de diámetro). 	<ul style="list-style-type: none"> 1500-3000 U.I., i.m. o i.v. 24 horas antes de la I.A. / monta.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS:

No tiene período de retiro.

En casos aislados, al igual que con todos los preparados protéicos, se pueden presentar reacciones anafilácticas poco después de la inyección. En tal caso el tratamiento normal es aplicar una inyección de Adrenalina (1:1000) por vía intravenosa o intramuscular cuando aparezcan los primeros signos.

También puede estar indicada la administración de corticosteroides.

Una vez reconstituido, el producto deberá almacenarse de 2 a 8°C por no más de 24 horas.

Almacenar a no más de 25°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.

Consulte al Médico Veterinario
Su venta requiere receta médica
cuantificada
Para uso exclusivo del médico veterinario

Presentaciones:

Frasco con liofilizado con 5000 UI + frasco con 5 ml de diluyente.

Caja con 5 frascos con liofilizado con 5000 UI + frascos con 5 ml de diluyente c/u.

Caja con 6 frascos con liofilizado con 5000 UI + 6 frascos con 5 ml de diluyente c/u.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35,
5830 AA Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo No. 369,
Colonia La Otra Banda, C.P. 01090,
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México
www.msd-salud-animal.com.mx



MSD

Animal Health