

Equilis®  
Te

180556 R1



## USO VETERINARIO

### COMPOSICIÓN

Por dosis de 1 ml

Principios activos:

Toxide tetánico 40 Lf<sup>1</sup>

Excipientes c.s.p 1 ml

<sup>1</sup> corresponde a > 30 UI/ml

### ESPECIE DESTINO

Equinos (Caballos y Ponies)

### INDICACIONES

Para estimular la inmunidad activa contra el tétanos

#### Tétanos.

**Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria**

**Duración de la inmunidad: 17 semanas después de la vacunación primaria**

**24 meses después de la primera revacunación**

### DOSIFICACION

1 ml

### RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACION

Inyección intramuscular de una dosis ( 1ml) por animal

Programa de vacunación (véase también esquema más abajo)

#### Tétanos

Programa de vacunación primaria

A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas. Los potros deben ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Si la vacunación se lleva a cabo antes de los 6 meses de edad, se puede esperar una protección completa después de la tercera vacunación cinco meses después.

<sup>1</sup> Corresponde a  $\geq 30$  UI/ml en la prueba de potencia de la Ph.Eur.

## Revacunación

La primera revacunación se administra 5 o 17 meses después de la vacunación básica, posteriormente, se recomienda un intervalo máximo de dos años entre cada revacunación ( Ver esquema)



### Vacunación de emergencia

La vacuna se puede utilizar junto con el Suero Tetánico de Intervet para el tratamiento de caballos lesionados que no han sido inmunizados contra el tétanos. En ese caso, la primera dosis del programa de vacunación primaria puede ser administrada conjuntamente con la dosis profiláctica apropiada del Suero Tetánico de Intervet en un lugar de inyección separado. La segunda dosis se puede administrar 4 semanas después tal como se describe arriba. Se recomienda repetir la inmunización contra tétanos después de 1 mes.

## CONTRAINDICACIONES

**No deben ser vacunados animales enfermos**

## PERIODO DE RETIRO

**Cero días**

## ADVERTENCIAS

- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8°C. No congelar.
- No usar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- Aplíquese solo en animales sanos.
- Utilice agujas y jeringas estériles para su aplicación.
- Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente de 15-25°C máximo 2 horas antes de su uso.
- Deseche el frasco mediante incineración.
- En caso de auto inyección accidental, consulte al Médico inmediatamente y muéstrelle el texto del envase o el prospecto.

**Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos**

## CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

## PRESENTACIONES

**Frasco de 1 mL o jeringas prellenadas con 1 mL.**

**Cajas de 1x1; 5x1 o 10x1 dosis.**

## ELABORADO Y EXPORTADO POR

**Intervet International B.V.**

**Wim de Konverstraat 35, Boxmeer, Holanda**

**Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.**

**Reg ICA: 9635 BV**

