



F VAX-MG*

Vacuna contra
Mycoplasma gallisepticum
Cultivo Vivo, Cepa Aviar



F VAX-MG es una vacuna viva que contiene la **cepa F de *Mycoplasma gallisepticum***, 10^{6.0} UCC (Unidades Cambio de Color) /dosis, en una preparación liofilizada y empacada al vacío que se recomienda para usar en pollas sanas de 9 o más semanas de edad.

Administrar por el método de aspersión como ayuda en la prevención de signos clínicos asociados con la infección por *Mycoplasma gallisepticum*.

CUANDO SE DEBE VACUNAR

F VAX-MG debe administrarse a pollas sanas de 9 o más semanas de edad, antes de que se expongan a la infección por *Mycoplasma gallisepticum* de campo y antes del comienzo de la producción de huevos.

CONTRAINDICACIONES

F VAX-MG no debe administrarse durante una semana antes ni durante una semana después de administrar vacunas vivas de Newcastle, Bronquitis o Laringotraqueitis, como tampoco durante 3 días antes, ni durante 7 días después de un tratamiento con oxitetraciclina, clortetraciclina y/o sulfonamida.

PREPARACION DE LA VACUNA

1. No abra, ni mezcle la vacuna sino hasta el momento de administrarla.
2. Mezcle sólo un vial a la vez y use todo el contenido durante la hora siguiente.
3. Quite el sello de aluminio del vial sin mover el tapón de caucho.
4. Prepare una mezcla de 30 gramos de leche en polvo por cada litro de agua destilada, a una temperatura entre 2° y 7° C.
5. Mantenga el vial sumergido en la mezcla de agua destilada con leche en polvo; levante el borde del tapón de caucho para permitir que el vial succione el agua (aproximadamente 30 ml).
6. Coloque nuevamente el tapón de caucho y agite suavemente hasta que la vacuna se disuelva por completo.
7. Vierta todo el contenido del vial en 100 ml de la mezcla de agua destilada con leche en polvo y revuelva suavemente. Enjuague el vial 2 o 3 veces.
8. La vacuna ya está lista para ser administrada.

COMO SE DEBE VACUNAR

La aplicación adecuada por aspersión se logra solamente usando un aspersor limpio que pueda emitir un rociado grueso. Use el método de aspersión solamente en establecimientos que puedan mantenerse cerrados durante la vacunación y por lo menos durante los 15 minutos siguientes. Ráfagas, corrientes de aire o ventiladores en funcionamiento pueden impedir la aplicación eficaz de la vacuna. Pase la vacuna al recipiente aspersor. Idealmente las gotas del rociador deben ser gruesas, de un tamaño en promedio entre 40 y 50 micrones. Rocíe la vacuna sobre todas las aves utilizando la medida que proporcione la mayor cantidad de vacuna ya sea: una dosis por pie cuadrado o una dosis por cada ave.

PRECAUCIONES

1. Para uso veterinario únicamente.
2. Vacune solamente aves sanas. Para evitar interferencia con el desarrollo de la protección, las pollas que se van a vacunar no se les debe administrar ningún antibiótico y/o sulfonamidas durante 3 días antes, ni durante 7 días después de la vacunación.
3. Todo el lote de aves debe vacunarse el mismo día. Separe las aves que se han de vacunar de otras aves susceptibles en las mismas instalaciones.
4. No derrame ni salpique la vacuna. Use el contenido total del vial una vez abierto. Queme los viales vacíos, tapones y toda la vacuna sobrante, como también los utensilios usados.
5. Lávese bien las manos después de haber usado la vacuna.
6. No diluya la vacuna ni rinda la dosis.
7. Almacene a una temperatura entre 2° y 7° C.
8. Se conoce que la cepa F de *Mycoplasma gallisepticum* produce enfermedad clínica en pavos. **NO PERMITA QUE LOS PAVOS ENTREN EN CONTACTO CON ESTA VACUNA NI CON POLLAS YA VACUNADAS.**

Tiempo de Retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESERVADORES

Esta vacuna contiene penicilina como agente preservador.

REGISTRO

Mantenga un registro con el tipo y cantidad de vacuna, número de lote, fecha de vencimiento y lugar de compra; fecha y hora de vacunación; número, edad, raza y lugar de las aves; nombres de operadores encargados de la vacunación y cualquier reacción que se observe.

Manufacturado por: Intervet Inc.

Omaha, Nebraska 68103, U.S.A. Licencia Veterinaria de EE.UU. No 165A

Importado por Intervet Colombia Ltda.

Bogotá, D.C. Tel: (1) 417 5466

Registro ICA No 7099 BV

*Marca Registrada

P00022-11