

Bacterina Mycoplasma Hyopneumoniae



M+PAC®
Emulsión
inyectable

50 ml
50 Dosis

USO VETERINARIO



MSD
Animal Health

Bacterina para ayudar a prevenir la neumonia enzoótica porcina causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*

COMPOSICION: Cada dosis de 1 ml del producto final contiene por lo menos una dosis protectora (1.0 RP) de antígeno *M. hyopneumoniae* determinado por la prueba de ELISA para el producto final. Excipientes c.s.p. 1ml.

DOSIS: Inyectar 1 ml vía subcutánea o intramuscular entre los 7 a 10 días de edad o mayores. Revacunar con 1 ml dos semanas después de la primera vacunación; revacunar con una sola dosis de 1 ml anualmente.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 60 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES: Inyección accidental puede causar reacciones locales serias. Contacte al médico inmediatamente si la inyección accidental ocurre.

PRESERVATIVOS: Ampicilina, Gentamicina y Timerosal.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consérvese a temperatura de 2° a 7°C. Evite la congelación.

Elaborado por:

Intervet Inc.
Omaha, Nebraska 68103, E.E.U.U.
Licencia Veterinaria de E.E.U.U. No. 165A

Importado y distribuido por:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Reg. ICA No. 4955-DB
COSTA RICA Reg. US3-64-22-1451

REP. DOMINICANA Reg. 3480
Intervet Ecuador S.A. – Guayaquil.
Registro: 4A-13397-AGROCALIDAD

NICARAGUA Reg. 5168

PANAMA Reg. RB-65-09

Guatemala Reg. MAGA No.:
US237-64-54-4125

Honduras Reg. No.: PB-401

El Salvador Reg. No.:

VET.99-08-1864



189589-04

Code 054039

Lote:

Fabr.:

Venc.: