


Nobilis®

CORVAC-4



USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Por dosis de 0,5 mL:

A. paragallinarum

- Cepa 083	(serotipo A)	al menos 1 DPP ₇₀ *
- Cepa Spross	(serotipo B)	al menos 1 DPP ₇₀
- Cepa H- 18	(serotipo C)	al menos 1 DPP ₇₀
- Cepa 48	(serotipo variante tipo B)	al menos 1 DPP ₇₀

* Dosis protectora del 70% de los pollos

INDICACIONES

Inmunización activa de pollos para reducir la infección y los signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*. Se ha demostrado que la vacuna protege desde tres semanas hasta al menos 49 semanas después de su administración.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Se inyectan 0,5 mL de vacuna por vía subcutánea a pollos de tres semanas en adelante y se repite la vacunación antes de la puesta. El intervalo mínimo entre las vacunaciones debe ser de 6 semanas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Las pollos pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al día siguiente.

Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el punto de inyección una pequeña hinchazón pasajera que desaparece gradualmente.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

- Agite bien el frasco antes de su uso.
- Utilice jeringuillas y agujas estériles.
- Evite contaminar el material de inyección o la vacuna.
- Vacune únicamente a animales sanos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conserve la vacuna a +2°C - +8°C. No congelar.

Una vez reconstituida, utilícela antes de tres horas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Venta bajo receta Médica.
Consulte al Médico Veterinario.

Fabricado por Intervet International B.V. - Boxmeer - Holanda
Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Reg. ICA No.: 6281 BV

Costa Rica. Reg. MAG. NL4-65-56-3275
Rep. Dominicana Reg. No.: 7944
Guatemala Reg. MAGA No.: NL94-65-56-758
Nicaragua Reg. No.: 9703
Panamá Reg. No.: RB-424-10
Honduras. Reg. No.: PB-610