

NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO

Nobilis Corvac

DECLARACIÓN DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Suspensión inyectable

Cada dosis de 0.5 ml de vacuna contiene:

Avibacterium paragallinarum

-cepa 083	(serotipo A)	al menos 1 DPP ₇₀ *
-cepa Spross	(serotipo B)	al menos 1 DPP ₇₀
-cepa H-18	(serotipo C)	al menos 1 DPP ₇₀

Parafina Líquida Ligera

PRODUCTO DE INTERVET INTERNATIONAL**BOXMEER - HOLANDA****ESPECIE DE DESTINO**

Aves

INDICACIÓN(ES)Vacunación contra la infección causada por *Avibacterium paragallinarum* en los pollos. Los pollos son vacunados con el fin de estimular una protección homóloga (serotipo específico) contra el tipo de cepas incorporadas en la vacuna.**DOSIS POR ESPECIE**

0.5 ml

INDICACIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Antes de usar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente (15°-25°C).

Agite la botella antes y de forma intermitente durante la aplicación.

Use jeringas y agujas estériles. Inyecte a las aves subcutáneamente en la parte inferior de la parte posterior del cuello.

Inyectar 0.5 ml de vacuna en aves de postura y reproductoras de 5 a 10 semanas de edad y vacunar pocas semanas antes del inicio de la postura. Debe haber un intervalo entre la vacunación de por lo menos 6 semanas.

Para alcanzar una protección en aves de postura y reproductoras de más de 60 semanas de edad se requieren dos vacunaciones.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna

PERIODO DE RETIRO

Cero días

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAJE, SI HAY

Almacenar entre 2°C y 8°C. Proteger de la luz. No congelar.

Periodo de validez después de abierto: 3 horas

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Vacunar únicamente animales sanos.

En caso de auto-inyección accidental, busque atención médica de inmediato y muéstrele este prospecto al médico.

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. Su inyección accidental / auto-inyección puede provocar un dolor intenso e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si la atención médica no se proporciona. En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, consulte con un médico, incluso si sólo una pequeña cantidad, y lleve el prospecto con usted.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si una pequeña cantidad ha sido inyectada, la inoculación accidental con este producto puede causar inflamación intensa, que puede, por ejemplo, resultar en necrosis isquémica e incluso en la pérdida de un dedo. Se requiere de atención médica experta e INMEDIATA y podría ser necesario practicar incisión e irrigar la zona de la inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo y el tendón.

No utilice en aves en periodo de postura.

No se han reportado interacciones cuando Nobilis Corvac fue aplicada simultáneamente con la vacuna inactivada de Intervet Nobilis IB +G+ND (ver reporte 3).

En animales sanos no se observan reacciones clínicas a la vacunación cuando se realizó en condiciones asépticas. Por algunas semanas posteriores a la vacunación, una leve inflamación puede ser palpada en el sitio de la inyección. Pueden ocurrir reacciones locales en el tejido.

No hay síntomas en particular en dosis dobles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para uso veterinario exclusivamente.

PRESENTACIÓN

Botella PET multidosis de 500 ml.

*70% Dosis protectora de pollo

Perú:

Importado y distribuido por: Intervet S.A., Av. República de Panamá 3956, Surquillo, Lima

RUC 20372399687

Reg. SENASA: B.01.4.01.1.424

Costa Rica Reg. MAG No.: NL4-65-56-4298

Rep. Dominicana Reg. No.: 5126

Guatemala Reg. MAGA No.: NL94-65-82-1263

Panamá Reg. No.: RB-416-10

Philippines YBPR No: R-253

Bangladesh DAR-80-2704(V)-95


NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

Nobilis® Corvac

STATEMENT OF THE ACTIVE SUBSTANCE(S)

Emulsion for injection.

Per dose of 0.5 ml vaccine:

Avibacterium paragallinarum

-strain 083	(serotype A)	at least 1 CPD ₇₀ *
-strain Spross	(serotype B)	at least 1 CPD ₇₀
-strain H-18	(serotype C)	at least 1 CPD ₇₀

Light liquid paraffin

PRODUCT OF INTERVET INTERNATIONAL
BOXMEER - THE NETHERLANDS
TARGET SPECIES

Chickens.

INDICATION(S)

Vaccination against *Avibacterium paragallinarum* infections in chickens. Chickens are vaccinated in order to stimulate (serotype-specific) homologous protection against the type of strains incorporated in the vaccine.

DOSAGE FOR EACH SPECIES

0.5 ml

ADVICE ON CORRECT ADMINISTRATION

Before using vaccine allow it to reach room temperature (15°-25°C).

Shake the bottle prior to and intermittently during application.

Use sterilized syringe and needles. Inject birds subcutaneously into the lower part of the back of the neck.

Injection of 0.5 ml of vaccine in layers and breeders from 5 till 10 weeks old and a revaccination a few weeks before the onset of egg production. Interval between vaccinations at least 6 weeks.

To achieve a protection in layers and breeders up to 60 weeks of age, two vaccinations are required.

CONTRAINDICATIONS

None

WITHDRAWAL PERIOD

None.

SPECIAL STORAGE PRECAUTIONS, IF ANY

Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze.

Shelf life after first opening: 3 hours.

SPECIAL WARNING(S)

Vaccinate only healthy animals.

In case of accidental self-injection, seek medical advice immediately and show the package leaflet or the label to the physician.

To the user:

This product contains mineral oil. Accidental injection/self injection may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given. If you are accidentally injected with this product, seek prompt medical advice even if only a very small amount is injected and take the package leaflet with you.

To the physician:

This product contains mineral oil. Even if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit. Expert, PROMPT, surgical attention is required and may necessitate early incision and irrigation of the injected area, especially where there is involvement of finger pulp or tendon.

Do not use in birds in lay.

No interactions have been found when Nobilis® Corvac was applied simultaneously with Intervet inactivated vaccine Nobilis® IB +G+ND (see report 3).

In healthy animals no clinical reactions to vaccination, carried out aseptically, will be observed. For some weeks after vaccination a slight swelling may be felt at the site of vaccination. Local tissue reactions may occur.

No particular symptoms at double dose.

OTHER INFORMATION

For animal treatment only.

*70% chicken protective dose