

CONTENIDO NETO: 500 ml (1000 dosis)

Nobilis® IB+ND Inac

Costa Rica Reg. MAG. No.: NL4-65-67-2832
Rep. Dominicana Reg. No.: 5083
Guatemala: Reg. MAGA. No.: NL94-65-83-1243
Honduras: Reg. No.: PB-611
Panamá: Reg. No.: RB-426-10
El Salvador: Reg. No.: VET2005-12-3348



REG. SAGARPA: B-0273-040

VACUNA INACTIVADA Y EMULSIONADA PARA LA INMUNIZACIÓN CONTRA LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR Y LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5830 AA Boxtmeer, Holanda

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo No. 369 Colonia La Otra Banda,
C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
www.msd-salud-animal.com.mx



USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Contiene la cepa M 41, tipo Massachusetts del virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar y la cepa LaSota Clone 30 del virus de la Enfermedad de Newcastle.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa Aviar y la Enfermedad de Newcastle.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 0.5 ml por vía intramuscular en la pechuga o por vía subcutánea en el tercio medio superior del cuello.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

En postura comercial y reproductoras entre las 10 y 18 semanas de edad.

ADVERTENCIAS:

- Conservarse en refrigeración entre 2 y 8°C. No congelar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Deseche el frasco mediante incineración.
- Antes de aplicar permita que alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- Agite vigorosamente la vacuna antes y durante su uso.
- Deseche el frasco mediante incineración.

194404 R2

Lote No.: / Fecha de Manufactura: / Fecha de Caducidad:

Imprint
Area