



Nobilis®

MS Live

Reg. SAGARPA B-0273-269
USO VETERINARIO

VACUNA LIOFILIZADA VIVA ATENUADA PARA LA INMUNIZACIÓN CONTRA
MYCOPLASMA SYNOVIAE.



FÓRMULA:

Cada dosis de 0.03 ml contiene:

Mycoplasma synoviae, cepa MS1, viva atenuada..... $\geq 10^{6.5}$ UFC*

*Unidades Formadoras de Colonias.

INDICACIONES

Inmunización activa de pollos para disminuir los signos clínicos y las pérdidas en la producción de huevos provocados por la infección con *Mycoplasma synoviae*.

DOSIS Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Reconstituir la vacuna con el volumen correspondiente de agua o diluyente para obtener por lo menos 1 dosis de 0.03 ml de la vacuna por animal para vacunar por vía ocular.

Cuando las aves son vacunadas por aspersión en cámara de aspersión, se debe de calcular un volumen de dosis de 0.5 ml por ave.

Las aves pueden vacunarse a partir de las 3 semanas de edad.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA

Para establecer un programa consistente de vacunación en una granja o complejo avícola específicos se deben tomar en consideración varios factores. Para que la vacuna sea totalmente efectiva, debe administrarse vía aerosol o vía ocular a animales sanos, receptivos que estén en un ambiente adecuado y tengan un buen manejo. El nivel de inmunidad requerido variará de acuerdo con las prácticas operativas y el grado de exposición.

Administración vía aerosol

Preparación de la vacuna

Una vez que la vacuna haya sido disuelta en agua, debe utilizarse en un periodo de 4 horas.

1. Utilizar agua limpia, fresca, sin cloro.
2. Abrir el envase bajo el agua.
3. Retirar el sello de aluminio y el tapón de hule del envase.
4. Añadir la vacuna a la cantidad de agua requerida para la aspersión.

Administración

1. La vacunación vía aerosol debe realizarse mediante una aspersión fina de menos de 20 micrones.
2. No utilizar ningún desinfectante o leche descremada en el aspersor.
3. Utilizar el aspersor únicamente para la administración de vacunas. Limpiar bien después de su uso.
4. Apagar todos los ventiladores mientras se realiza la aspersión de la vacuna. Cerrar también las entradas de aire.
5. Seguir las recomendaciones del fabricante del aspersor referentes al volumen de agua.

Administración vía ocular

Preparación de la vacuna

La vacuna debe utilizarse en un periodo de cuatro horas después de haberla disuelto en el solvente.

1. Abra la vacuna y el vial del Diluyente Oculo-Nasal de Intervet
2. Conecte ambos viales utilizando el tubo conector de plástico.
3. Agite los viales conectados hasta que la vacuna esté disuelta.
4. Retire el vial pequeño, transfiera el líquido al envase de plástico y únalo al gotero.

Administración

1. Administre una gota en el ojo de cada ave.
2. Mantenga el frasco gotero invertido, en posición vertical, para asegurar que la cantidad de la gota sea adecuada y evitar que la vacuna se desperdicie.

ADVERTENCIAS ESPECIALES, EN CASO DE SER NECESARIAS

Vacunar sólo a pollos sanos.

Utilizar todo el contenido de la vacuna una vez abierta.

Evitar el contacto accidental con los ojos y la piel. El operador debe utilizar mascarilla y lentes de protección.

Puede utilizarse durante la puesta.

La administración de medicamentos anti-*Mycoplasma* cinco días antes o dos semanas después de la vacunación puede ser perjudicial para las cepas de la vacuna.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario.

Nobilis MS Live puede ser mezclada y utilizada en conjunto con Nobilis® MG 6/85 a partir de las seis semanas de edad. Consulte las indicaciones de la utilización de Nobilis MG 6/85 antes de su uso.

Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

Almacenar en refrigeración (2°C - 8°C)

No congelar.

Proteger de la luz.

No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

Periodo de validez después de su reconstitución: 4 horas.

PRECAUCIONES

Utilice todo el contenido cuando se abra por primera vez.

Incinere este envase y todo el contenido sin utilizar.

TAMAÑO DEL EMPAQUE

1000 o 2000 dosis

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA Boxmeer

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México S.A. de C.V.
Av. Paseo de los Frailes No. 22,
Parque Industrial Santiago Tianguistenco
C.P. 52600, Estado de México
Tel.: 01 (713) 13 50 300
www.msd-salud-animal.com.mx

