



10x1  
dosis

## Nobivac® PUPPY DP



VACUNA LIOFILIZADA VIVA CONTRA MOQUILLO Y PARVOVIROSIS CANINA EN CACHORROS

A PARTIR DE LA SEXTA SEMANA DE EDAD

USO VETERINARIO 10 X 1 DOSIS

Composición: Cada 1 mL (1 dosis) contiene:

Virus de moquillo canino cepa Onderstepoort 10<sup>5</sup> DICC

Virus de Parvovirus cepa clonada 154 10<sup>7</sup> DICC

Dosificación: 1 mL por inyección intramuscular o subcutánea. Conservar entre +2°C y +8°C

No congelar Reg. ICA 4400 DB

Costa Rica Reg. MAG No.: NL-4-65-5-5441

Guatemala Reg. MAGA No.: NL94-65-05-4124 Honduras Reg. No.: PB-728

Nicaragua Reg. No.: 9758 Panamá Reg. No.: RB-522-13 El

Salvador Reg. No.: VE2014084966

Ecuador: Reg. 4A-7256-AGROCALIDAD



MSD  
Animal Health



109383 R1

## Nobivac® PUPPY DP

Uso veterinario

### DESCRIPCIÓN

La vacuna contiene cepas vivas, atenuadas, liofilizadas de virus del moquillo canino (cepa VMC Onderstepoort) y parvovirus canino (cepa PVC 154) reproducidas en cultivos de líneas celulares. Se presenta en forma de gránulo liofilizado en viales de dosis única que contienen como mínimo 10<sup>5,0</sup> TCID<sub>50</sub> de VMC, y 10<sup>7,0</sup> TCID<sub>50</sub> de virus de vacuna. Cada vial contiene una dosis única a reconstituir. La vacuna también contiene estabilizadores y trazas de antibióticos.

### INDICACIONES

Para la inmunización activa de cachorros jóvenes contra el moquillo canino (VMC) y la enfermedad por parvovirus canino (PVC).

### PROGRAMA DE VACUNACIÓN

Nobivac Puppy DP está indicado para el uso en animales con niveles elevados de MDA contra el virus del moquillo canino/parvovirus canino. La edad más temprana a la que éstos niveles no interfieren con la vacunación es de 6 semanas en la mayoría de animales. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados de MDA y proporcionar protección contra hepatitis (AVC1), infecciones por AVC2 y parainfluenza, se aconseja revacunar con Nobivac DHPPi. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac Puppy DP forme parte de pautas de vacunación más amplias:

- 4-6 semanas de vida - Nobivac Puppy DP
- 8-9 semanas de vida - Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto
- 12 semanas de vida - Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto, Nobivac Rabia o Nobivac RL

### REVACUNACIÓN

Se recomienda que los perros se revacunen contra:

1. Moquillo canino, hepatitis canina - cada 2 años
2. Parvovirus canino, virus de parainfluenza canina - cada año
3. Rabia - cada 3 años (puede modificarse para cumplir con los reglamentos locales).

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía subcutánea. Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición del contenido de un vial (1,0 ml) de Nobivac Solvent. La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

### RECOMENDACIONES DE USO

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación. Deberá utilizarse equipo estéril para la administración y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol.

### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos.

### PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS Y CONSERVACIÓN

La vacuna deberá conservarse refrigerada (entre +2 y +8°C) y en la oscuridad. Deberá evitarse la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez sacada de la nevera antes de usar; la potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor. Nobivac Solvent puede conservarse a temperatura ambiente.

### PRESENTACIÓN

Cajas que contienen viales de Nobivac Puppy DP y viales de Nobivac Solvent o cajas que contienen sólo viales de Nobivac Puppy DP.

### CANTIDAD POR CAJA

Cajas de cartón de 5, 10, 25 ó 50 viales de dosis única.  
Cajas de plástico transparente de 5, 10, 25 o 50 viales de dosis única.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

La experiencia ha demostrado que el estado de los anticuerpos maternos de los cachorros de la camada varía enormemente y no deberá confiarse sólo en la exploración serológica de la perra.

Importado y distribuido por Intervet S.A., Av. Los Frutales 245, Cuarto Piso, ATE, Lima 03, RUC: 20372399687

Reg. SENASA: B.01.2.03.1.396

Venta bajo receta

Importado por Intervet Ecuador S.A.

Reg. 4A-7256-AGROCALIDAD

Importado y distribuido por Intervet Ecuador S.A. - Guayaquil 4A-7256-  
AGROCALIDAD

Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Reg. ICA No. 4400-DB

**Consulte al médico veterinario**

**Venta bajo fórmula del médico veterinario**

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Manufacturado por:  
INTERVET INTERNATIONAL B.V.  
BOXMEER - HOLANDA