

Coopers
RALGRO
 Pellet.
 Implantes paraganadobovino.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada pellet contiene 12 mg de Zeranol.

DOSIFICACIÓN: 36 mg (3 Pellets, cada uno conteniendo 12 mg de Zeranol).

INDICACIONES: RALGRO es un promotor de crecimiento que incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia de los terneros lactantes y destetos, machos de levante, novillos y toros para ceba y hembras de desecho.

RALGRO tiene excelente tolerancia y no tiene efectos indeseables. Se puede utilizar en animales desde un día de nacidos, hasta el sacrificio.

RALGRO es un producto sin toxicidad, no ha demostrado efectos teratogénicos ni carcinogénicos y no representa ningún riesgo para la salud pública, además no deja residuos en la carne de los animales implantados.

ADVERTENCIAS: No utilizar el lugar del implante para alimentación humana o animal. Implantar los Pellets solamente en la cara posterior de la oreja vía subcutánea. No se permite otra localización.

PRECAUCIÓN: No implantar vacas lecheras en producción. Ni machos o hembras destinados a la reproducción.

USO VETERINARIO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.

Contenido: Cartucho x 24 Dosis

Almacenar por debajo de 25°C.

Producido por: Intervet GesmbH - Viena - Austria

Importado en Colombia por: Intervet Colombia Ltda., Bogotá.

REGISTRO ICA: 5358-DB

REGISTRO ECUADOR: 2B1-1136-AGROCALIDAD

PANAMA: RF-1376-10


Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F 000356/04

Nicaragua Reg. No.: 9757



COD. 750803C



**PROMOTOR DE CRECIMIENTO
 PARA GANADO BOVINO.**



INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE **RALGRO**



1. Inserte el cartucho en el implantador con el eje mayor hueco hacia atrás (en dirección a la empuñadura de el implantador), hasta quedar encajado en su emplazamiento.
2. Mire en la ventanilla superior del cartucho lleno, para comprobar que un cilindro con implantes se halla en posición centrada, listo para implantar.
3. Limpie la cara externa de la oreja del animal con un trozo de algodón o gasa humedecido con alcohol.
4. Puncione la piel con la aguja en la cara externa de la oreja y en la base inferior de la misma. Dirija la aguja hacia la base de la oreja en el pliegue que ésta hace de la cabeza, justamente debajo de la piel; nunca a través del cartilago.
5. Cuando la punta de la aguja ha penetrado unos 2.5 centímetros desde el punto de inyección, oprímase el gatillo una sola vez para depositar el implante RALGRO, retire la aguja lentamente manteniendo oprimido el gatillo extendido en el émbolo.
6. Retire la aguja, desinféctela con alcohol u otro desinfectante adecuado.
7. Limpie el émbolo extendido, con algodón humedecido en alcohol.
8. Gire el cartucho en la dirección de la flecha hasta quedar visible y centrada en la ventanilla, una nueva dosis. Así la pistola queda dispuesta para la siguiente implantación.