



MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
SOLUCIÓN INYECTABLE

Reverin® LA Plus es una combinación de un antibiótico de amplio espectro a base de oxitetraciclina y diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esterooidal, analgésico y antipirético.

Modo de acción

Las Tetraciclinas tienen acción en microorganismos Gram positivos, Gram negativos, clamidias, rickettsias y la acción en algunos protozoarios. Luego de su administración, alcanzan a los microorganismos y se unen irreversiblemente a nivel de los ribosomas, impidiendo la conjugación de los aminoácidos para la formación de proteínas bacterianas, inhibiendo la síntesis de las mismas.

El diclofenaco sódico es un derivado del ácido fenilacético que ejerce acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica por inhibición de la ciclooxigenasa y de la síntesis de prostaglandinas, mediadores de la fase vascular de la inflamación.

Composición o Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Oxitetraciclina base 20,00 g

Diclofenaco sódico 0,50 g

Vehículo c.b.p 100,00 ml

Indicaciones

BOVINOS

Indicado para el tratamiento y el control eficaz de las infecciones en ganado bovino causadas por bacterias sensibles al principio activo de la formulación tales como: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum*, *Corynebacterium bovis*, *Pasteurella multocida*, *Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes*, *Listeria monocytogenes*, *Moraxella bovis*, *Salmonella Typhimurium*, *Clostridium perfringens*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus pneumoniae* e *Shigella flexneri*.

Vía de administración y dosificación

En la aplicación de medicamentos inyectables deben seguirse condiciones generales de asepsia. Puede aplicarse por la vía subcutánea e intramuscular. La dosis indicada es de 1 ml cada 10 kg de peso equivalentes a 20 mg de Oxitetraciclina y 0,5 mg de Diclofenaco sódico por kg de peso. Cuando el volumen que debe aplicarse es superior a 10 ml, se recomienda dividir este volumen y administrar el fármaco en dos o más puntos. La dosis puede repetirse según criterio del Médico Veterinario.

Período de espera o retiro

No administrar a hembras en lactancia, cuya leche sea destinada al consumo humano. No usar este producto 35 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Contraindicaciones / Advertencias

- No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- No administrar en animales con alteraciones hepáticas.
- No administrar en equinos, perros ni gatos.

Efectos Colaterales / Contraindicaciones / interacciones con medicamentos

Puede haber reacciones alérgicas y anafilácticas.
Fotosensibilidad y formación del quelato cuando se utiliza con Ca, Fe, Co y Al.
Cambios en los huesos.

Presentación

Frasco conteniendo 50 ml de solución inyectable.

Advertencias:

Conserve en local fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar por debajo de 15°C a 30°C.

Este y todos los medicamentos deben permanecer fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
Rodovia Anhanguera SP 330 s/n°, km 298,
Cravinhos-SP, Brasil.

Para:

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.

Industria Brasileña

® Marca Registrada

Importado y distribuido por:

En Ecuador: Intervet Ecuador S.A.

Reg. N° 2C1-6256-AGROCALIDAD

En Perú: Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2,

Oficina 1901 Santiago de Surco.

RUC: 20372399687 - Reg. SENASA: F.03.01.I.0773

República Dominicana Reg. No.: 3889

En México:

Intervet México, S.A. de C.V.

Reg. SAGARPA: Q-0273-214

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx

50001624/0216 MK01



Frente

Verso