

LEER A ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES:

Usar guantes de caucho y mascar al mezclar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación. Evitar el contacto accidental con piel y ojos. Lavarse las manos con agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa una vez finalizado el trabajo.

INSTRUCCIONES RIMERS AUXILIOS

Evitar la intoxicación en el animal. El medicamento debe ser aplicado al Médico y muestra el nombre del establecimiento.

No hay antidoto específico del tratamiento de los casos sintomáticos.

Evitar la intoxicación del animal al usar el medicamento veterinario.

PRECAUCIONES PARA LA FAUNA

No arrojar productos a fuentes de agua. Producto tóxico en peces.

CONSERVACIÓN

Mantener el envase bien tapado. Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

NO UTILIZAR EN VASES PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA BEBIBLE.

Después de usar el contenido, todo material y envase sobrantes deben desecharse acorde con la legislación local.

INDICACIONES

Erboviosparabotrolde
garrapatasBoophilismicropus
yAmblymmeacajennense



Coopers 470mL
TRIAOX®
Concentrado Emulsionable
USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN GARAMENTADA:

Cada 100 mL de TRIAOX contiene:
Amitaz 125g
Excipientes c.p. 100 mL

VENTA BAJO FÓRMULA DE MEDICAMENTO VETERINARIO

Registro ICANo.1111-DB
Registro Ecuador 3A2-585-SA

Fabricado por Schering-Plough Animal Health
2667 W. DaS, Torrance, CA 90714 (USA)
Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá D.C., Colombia.

Costa Rica Reg. MAG No. US57-406-312
República Dominicana Reg. No. 3851
Guatemala Reg. MAG No. 25-11-67-12,794
Nicaragua Reg. No. 2614
Panamá Reg. No. RF-222-02
El Salvador Reg. No. VET 200-01-0923



DOSIFICACIÓN

Margen de dispersión y bomba de mano:
Mezclar 1 litro de TRIAOX por cada 600 litros de agua.
La dilución debe prepararse inmediatamente antes de usar. Generalmente cuando
se utiliza la bomba de mano un animal requiere entre 4 y 6 litros de dilución.

Una vez concluido el baño, desechar el líquido sobrante.

NO USAR EN BAÑOS DE INMERSIÓN

NO USAR EN EQUINOS.

NO TRATAR ANIMALES MENORES DE TRES (3) MESES DE EDAD

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO
HUMANO HASTA 14 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZAR DEL TRATAMIENTO. LA
LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 24 HORAS DESPUÉS DE
FINALIZAR DEL MISMO NO DEBE SER ALCANZADA PARA CONSUMO HUMANO.

TRATAMIENTO ROUTINARIO CONTRA GARRAPATAS

Evitar la intoxicación en el animal. El medicamento debe ser aplicado al Médico y muestra el nombre del establecimiento.
Evitar la intoxicación del animal al usar el medicamento veterinario.
No arrojar productos a fuentes de agua. Producto tóxico en peces.
Mantener el envase bien tapado. Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.
No utilizar en vasos para conservar alimentos o agua bebibles.
Después de usar el contenido, todo material y envase sobrantes deben desecharse acorde con la legislación local.
Indicaciones: Erboviosparabotrolde garrapatas Boophilismicropus y Amblymmeacajennense.

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto
co-responderán a las rotas de senlaticetay que medianteregistro oficial de venta se
verificó que se respaldan los fines de aplicación de los datos de eficacia y las indicaciones
de empleo.



7 702502 1004243 >

181406 R1

181406 R1



MEDICAMENTO TÓXICO
CUIDADO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

