

146460-02

# VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BOLSA DE FABRICIO

Virus Vivo

## UNIVAX™ PLUS

**USO VETERINARIO. LIOFILIZADO**

**INDICACIONES PARA SU USO**

**LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS CUIDADOSAMENTE**

Use todo el contenido del frasco una vez abierto.

No vacune dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Almacene a una temperatura de 2° y 7°C (35 y 45°F).

Se adiciona gentamicina como conservador.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**ADVERTENCIA:** Incinere todos los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante. Para uso veterinario solamente. No diluya ni extienda la dosificación de manera alguna.

### DESCRIPCIÓN

Esta vacuna contiene una mezcla de dos cepas intermedias seleccionadas cuidadosamente del virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio. Una de las cepas (ST-12) se desarrolla en cultivos de tejido y la otra (51-A) en embriones de pollo. Ambas cepas se combinan con agentes estabilizadores.

### INDICACIONES DE USO

Para la vacunación de pollos sanos (polla de reemplazo comercial, pollo de engorda y reproductoras) por vía oral en el agua de bebida a las 2 semanas de edad o mayores como una ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio.

### PROGRAMA DE VACUNACIÓN

Muchos factores deben ser considerados en la determinación de un programa de vacunación adecuado para una granja en particular o cualquier operación de aves de corral. Para ser completamente eficaz, la vacuna debe administrarse a pollos sanos que se mantengan en un medio ambiente adecuado bajo buenas condiciones de manejo. Además, la respuesta puede ser modificada por la edad de los pollos y su estado inmune. Rara vez una vacuna en condiciones de campo produce una protección completa para todos los individuos de una parvada. La protección desarrollada varía con el tipo de operación y el grado de exposición de la parvada que probablemente encuentre. Por estas razones, un programa de revacunación periódica puede ser requerido.

### PRECAUCIONES

#### VACUNE SOLAMENTE AVES SANAS

Consulte con su patólogo aviar para obtener recomendaciones adicionales basadas en las condiciones presentes en su área.

Todos los pollos susceptibles que se encuentren en las mismas instalaciones deberán ser vacunados al mismo tiempo. Si esto no es posible, entonces deberán mantenerse en estricto aislamiento para evitar el contacto con las aves no vacunadas. Se deben realizar grandes esfuerzos para reducir las condiciones de estrés al momento de administrar la vacuna.

### CUIDADO

Se deben tener los cuidados necesarios para prevenir la contaminación de manos, ojos y ropa con la vacuna.

### PREPARACIÓN DE LA VACUNA

#### ADMINISTRACIÓN EN EL AGUA DE BEBIDA

**NO ABRA NI MEZCLE LA VACUNA HASTA ESTAR LISTO PARA COMENZAR LA VACUNACIÓN. USE LA VACUNA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERLA MEZCLADO.**

El agua de beber para la vacunación debe mezclarse con leche en polvo para prevenir que la vacuna sea inactivada por el cloro y otros aditivos en el agua así como para estabilizar al virus de la vacuna. La leche en polvo debe añadirse al agua a una proporción de 3 gramos por 11 litros (una cuchara de té llena por 3 galones E.U.A. o 2.5 galones Imperiales); o 90 gramos por 300 litros (una cuchara llena por 80 galones E.U.A. o 66 galones Imperiales).

1. Reúna la vacuna y el equipo necesario para vacunar todas las aves de una sola vez.
2. No abra y mezcle la vacuna antes de estar listo para usarla.
3. Quite el sello de aluminio del vial de la vacuna sin mover el tapón de goma.
4. Use agua para beber, limpia, fresca y sin cloro a la que se le ha añadido leche en polvo como se indica en COMO VACUNAR.
5. Quite el tapón de hule del vial de la vacuna y rehidrátela llenando el vial hasta cerca de la mitad con agua de beber limpia no clorada a la cual se le ha añadido la leche en polvo.
6. Coloque el tapón en posición original y agite hasta disolver completamente la vacuna.

*La vacuna está ahora lista para usarse por el método del agua de bebida. Para lograr mejores resultados asegúrese de seguir cuidadosamente las indicaciones.*

## **COMO VACUNAR ADMINISTRACION EN EL AGUA DE BEBIDA**

No proporcione agua a las aves antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas. Lave y enjuague bien los bebederos para quitar todo residuo de desinfectantes. Diluya la vacuna inmediatamente antes de usarla con agua limpia, fresca y sin cloro (con la leche añadida). Vierta la vacuna rehidratada dentro de los siguientes volúmenes de agua y mezcle bien:

Cada 1 000 aves	Galones E.U.A.	Galones Imperiales	Litros Métricos
2 a 4 semanas de edad	2.5	2	10
4 a 8 semanas de edad	5	4	20
Más de 8 semanas de edad	10	8	40

Distribuya la vacuna diluida de manera que todas las aves puedan beber dentro del término de una hora. La vacuna diluida deberá ser lo único que puedan beber hasta que ésta se haya consumido completamente. Evite la exposición del agua al sol.

### **AVISO**

Todas las vacunas de Intervet Inc. liberadas para venta cumplen los requisitos de la autoridad otorgante (Departamento de Agricultura de los EE.UU) en materia de seguridad, pureza, potencia y capacidad de inmunizar pollos susceptibles.

### **PRECAUCIÓN**

La capacidad de esta vacuna para producir resultados satisfactorios depende de muchos factores, incluyendo pero no limitándose a condiciones de almacenamiento y manejo del usuario, administración de la vacuna, salud y respuesta del animal; y grado de exposición en campo. Por lo tanto, las indicaciones de uso deberán seguirse cuidadosamente. El uso de esta vacuna está sujeto a la aplicación de las leyes y regulaciones estatales y federales.

**Contenido neto:** 2500 y 5000 Dosis

**"Consulte al Médico Veterinario"**

**VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO**

**Fabricado por:**

Intervet Inc.  
Omaha, NE 68103, EE.UU.  
Lic. Vet de EE.UU. No. 165A

**Importado y Distribuido por:**

Intervet Argentina S.A.  
Cazadores de Coquimbo 2841  
Munro, Vicente López (B1605AZE), Argentina.  
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez MPBA 4505  
■ SENASA CERT. N° 99133  
Establecimiento inscripto N° 11.792  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160  
Mantener fuera del alcance de los niños.

**México**

Consulte al Médico Veterinario  
Reg. SAGARPA N° B-0273-222  
Importado y Distribuido por Intervet México S.A. de C.V.  
Av. Paseo de los Frailes No. 22  
Parque Industrial Santiago Tianguistenco  
C.P. 52600 Estado de México.  
www.msd-salud-animal.com.mx

**Perú**

Reg. Senasa: B.01.1.01.I.274  
Importado y Distribuido por Intervet S.A.  
Av. República de Panamá 3956, Surquillo - Lima  
RUC 2037239887  
Venta bajo receta

**Venezuela:**

Importado y distribuido en Venezuela por:  
Intervet Venezolana S.A RIF J-30327783-7  
Registro M.A.T - SASA: B.I.7.708  
Asesor Técnico: Alba Codutti  
Solo para uso Veterinario  
Manténgase Fuera del Alcance de los Niños  
Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario

**Intervet Ecuador S.A.**

Ecuador Reg.No. 4A-5294-AGROCALIDAD  
Venta bajo receta del Profesional Veterinario

Costa Rica: Registro N° US27-65-69-1399

Guatemala: Registro N°

Nicaragua: Reg. No. 516

Panamá: Registro N° RB-63-09

Paraguay: Registro N° 6.396

Rep. Dominicana: Reg. No.: 3320

Uruguay: Registro N° A-4739

Honduras Reg. No.: PB-420

El Salvador: Reg. No.: VE2014074957

146460-02