

FICHA TÉCNICA

ACUAFLO[®] 50%

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada 100 g contienen: Florfenicol: 50 g Excipientes c.s.p.: 100 g
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Bolsa de 2 kg.
INDICACIONES:	Para todas las especies y todos los tamaños de peces de agua fría, peces de agua templada y camarones para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles al florfenicol como <i>Aeromona sp.</i> , <i>Aeromona salmonicida</i> , <i>Flavobacterium psychrophilum</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Edwardsiella ictaluri</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> , <i>Flavobacterium columnare</i> , <i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i> , entre otras.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Peces de agua fría, templada y camarones.

FORMA FARMACÉUTICA:

Polvo.

DESCRIPCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro para incorporar al alimento para acuicultura.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Camarón

5mg/kg de peso de Florfenicol durante 10 días consecutivos por vía oral en el alimento.

En peces para Streptococcus iniae y Francisella asiática

15 mg/kg de peso de florfenicol durante 10 días consecutivos por vía oral en el alimento.

Todas las demás indicaciones en peces

10 mg de florfenicol por kg de peso durante 10 días consecutivos por vía oral en el alimento.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizarse en animales en reproducción.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacénese en lugar seco entre 2-30°C

Mantener alejado de otros alimentos e implementos alimentarios.

Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para su consumo humano hasta:

Peces de agua fría: 15 días después de finalizado el tratamiento.

Peces de agua cálida: 12 días después de finalizado el tratamiento.

Camarón: 21 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: MSD Animal Health EEUU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.