

FICHA TÉCNICA

BOVILIS® VISTA ONCE SQ

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Ingredientes activos	Cantidad en una dosis de 2 ml
	<i>Mannheimia haemolytica</i>	≥ 6 x 10 ⁵ CFU
	<i>Pasteurella multocida</i>	≥ 6 x 10 ⁵ CFU
	IBR	≥ 10 ^{3.6} TCID ₅₀
	BVD1	≥ 10 ^{3.6} TCID ₅₀
	BVD2	≥ 10 ^{3.4} TCID ₅₀
	PI ₃	≥ 10 ^{5.1} TCID ₅₀
	BRSV	≥ 10 ^{3.8} TCID ₅₀

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Vacuna en viales de vidrio, que contienen 5, 10, 50 o 100 dosis. Diluyente en viales de plástico, que contienen 10, 20, 100 o 200 ml.

INDICACIONES: Para la vacunación de ganado bovino saludable, de 3 meses de edad o de mayor edad, como una ayuda en el control de las enfermedades respiratorias y reproductivas causadas por el virus de la rinotraqueitis bovina (IBR); el virus de la diarrea viral bovina (BVD) (Tipos 1 y 2); el virus de la enfermedad respiratoria viral sincitial bovina (BRSV), el virus de la parainfluenza 3 (PI₃) la *Mannheimia haemolytica* y la *Pasteurella multocida*.

ESPECIES DESTINO:

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Bovilis Vista Once SQ se encuentra deshidratada y el diluyente acompañante se utiliza para rehidratar la vacuna. Una vez que el producto se encuentra en suspensión, está listo para inyección.

FOTO DEL
PRODUCTO

1

MECANISMO DE ACCIÓN:	
Bovilis Vista Once SQ, una vez reconstituida, contiene cultivos vivos modificados de IBR, de BVD Tipos 1 y 2, de PI ₃ y de BRSV y cepas mutantes vivas de <i>Pasteurella multocida</i> y de <i>Mannheimia haemolytica</i> estreptomicina dependientes para la inmunización activa.	
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	
La vacuna se administra por inyección subcutánea de de 2 ml a bovinos saludables de 3 meses de edad o de mayor edad. Se recomienda la re-vacunación anual.	
CONTRAINDICACIONES:	
No vacunar animales enfermos o animales que puedan ser afectados por enfermedades subclínicas, estrés o inmunodeprimidos.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacénesse a +2 a +8 °C. No la congele.	
PERIODO DE RETIRO:	
Cero días.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. USA	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.