

FICHA TÉCNICA

BREEDERVAC® IV PLUS

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	<p>Cada dosis contiene:</p> <p>Virus inactivo de la enfermedad de la bolsa de Fabricio, cepa D-78 (clon seleccionado) ≥ 200.00 EU</p> <p>Virus inactivo de la enfermedad de la Bolsa de Fabricio, cepa Variante A (1084A) ≥ 22.83 mg</p> <p>Virus inactivo de la enfermedad de la Bolsa de Fabricio, cepa Variante GLS-5 ≥ 200.00 EU</p> <p>Virus inactivo de la enfermedad de Newcastle, tipo B1, cepa La Sota (Clone-30) ≥ 36.36 mg</p> <p>Virus inactivo de la Bronquitis Infecciosa Aviar, cepa M-41, serotipo Massachussets ≥ 40.91 mg</p> <p>Virus inactivo de Reovirus aviar, cepa 1733 ≥ 6.36 mg*</p> <p>Virus inactivo de Reovirus aviar, cepa 2408 ≥ 6.36 mg*</p>
-----------------	---

Vehículo c.b.p 1 dosis

*Concentrado 10 veces

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos de 500 ml (1000 dosis).

INDICACIONES: Vacunación de reproductoras contra las enfermedades de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Gumboro y Reovirus

Breedervac® IV Plus, provee un amplio espectro de protección contra la EIB (causadas por cepas de virus estándar, Delaware A, Delaware E y GLS) y Reovirus así como una sólida protección contra Newcastle y Bronquitis Infecciosa (tipo Mass).

En reproductoras en crecimiento, induce altos y uniformes anticuerpos contra EIB, ND, IB y Reovirus a través del ciclo entero de producción. Provee un amplio espectro de protección contra cepas prevalentes de EIB y Reovirus.

Contiene un inmunoestimulante seguro de Intervet y adyuvante oleoso estable.

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral (reproductoras y de reemplazo).

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión oleosa

FOTO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:	
Vacuna tetravalente inactivada y emulsionada para la prevención de la Reovirus aviar, la Bronquitis Infecciosa y las enfermedades de Gumboro y Newcastle.	
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	
Aplicar 0.5 mL por ave vía intramuscular en la pechuga o vía subcutánea en la región media del cuello.	
CONTRAINDICACIONES:	
No administre esta vacuna a las aves durante el periodo crítico de postura, desde el comienzo hasta la producción máxima de huevos, pueden aparecer caídas en la producción de huevo.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz	
PERIODO DE RETIRO:	
No vacunar pollos dentro de los 42 días al sacrificio	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. USA	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.