

FICHA TÉCNICA

BURSAVAC®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	<p>Cada dosis contiene: Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio (EIB), cepa Moulthrop cuando se titula por virus en embrión de pollo $\geq 10^{1.5}$ EID₅₀ cuando se titula en aves $\geq 10^{0.5}$ EID₅₀</p> <p>Vehículo c.b.p. 1 dosis</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 10 viales de 1,000 dosis cada uno.
INDICACIONES:	Para la inmunización de aves sanas y como ayuda en la prevención contra la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio o Gumboro, causada por cepas estándar y variantes del virus responsable de esta enfermedad.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves (gallina de postura, comercial y reproductoras) con historial previo de Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio.

FORMA FARMACÉUTICA:

Vacuna Liofilizada

DESCRIPCIÓN:

Vacuna replicada en embriones de pollo SPF, elaborada con la cepa Moulthrop; seleccionada por ser altamente antigénica y estimular altos niveles de anticuerpos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para la vacunación de aves sanas de 7 a 14 días de edad por vía oral, administrada en agua de bebida. Evite la administración de cualquier medicamento o desinfectante en el agua de bebida, preferentemente 72 horas antes de la vacunación y 24 horas después de la misma. Provea con suficientes bebederos a los animales, de tal manera que al menos 2/3 partes de las aves puedan beber al mismo tiempo. Vierta agua fresca y limpia. No proporcione agua a las aves 2 horas antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas. Adicionar la vacuna rehidratada en 5.7 litros/1,000 dosis en agua limpia, libre de cloro. Distribuya la vacuna entre los bebederos provistos para los pollos. Evite la exposición directa con los rayos del sol. La vacuna deberá ser la única fuente de hidratación hasta que ésta se haya consumido completamente.

Edad de las aves	1,000 Dosis diluidas en:
7 – 14 días	5.7 litros de agua
2 – 4 semanas	10 litros de agua
4 – 8 semanas	20 litros de agua
8 semanas o más	40 litros de agua

Puede ser empleada como primo-vacunación en gallinas reproductoras de 6 semanas de edad o mayores, o bien como revacunación en aves de 8 semanas de edad o mayores.

2

CONTRAINDICACIONES:	
No se recomienda el uso de esta vacuna en pollos de engorda o aves tipo Leghorn.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. EEUU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.