

## FICHA TÉCNICA

### CHORULON®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Chorulon® se presenta en forma de pastilla liofilizada, blanca, cristalina conteniendo 500, 1500 ó 5000 UI de gonadotropina coriónica por vial, acompañada del diluyente correspondiente.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Frasco con liofilizado con 5000 UI + frasco con 5 ml de diluyente.

Caja con 5 frascos con liofilizado con 5000 UI + frascos con 5 ml de diluyente c/u.

Caja con 6 frascos con liofilizado con 5000 UI + 6 frascos con 5 ml de diluyente c/u.

FOTO DEL PRODUCTO

INDICACIONES:

Especie

Indicaciones

Bovinos (Vacas y novillas)

- Mejora la tasa de concepción
- Tratamiento de quistes foliculares

Cerdos (Cerdas adultas y primerizas)

- Inducción y sincronización de la ovulación.

Caballos (Yegua)

- Inducción de la ovulación

ESPECIES DESTINO:

Bovinos (Vacas y novillas), Cerdos (Cerdas adultas y primerizas) y Caballos (Yegua)

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución inyectable.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Chorulon® (gonadotropina coriónica) es una glucoproteína compleja capaz de suplementar y sustituir la hormona luteinizante segregada por la glándula pituitaria anterior tanto en el macho como en la hembra. En la hembra Chorulon® promueve la maduración del folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En el macho Chorulon® estimula la producción de testosterona y de esta forma influye sobre el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales primarios y secundarios.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Especie	Indicaciones	Dosis y administración
Bovinos (Vacas y novillas)	• Mejora la tasa de concepción	• 1 500 U.I., i.m o i.v. en el momento de la I.A. / monta y / o 4 a 6 días posteriores.

	• Tratamiento de quistes foliculares	• 3000 U.I., i.v.
Cerdos (Cerdas adultas y primerizas)	• Inducción y sincronización de la ovulación.	• 500 U.I., i.m. 24 horas antes o al momento de la I.A. / monta.
Caballos (Yegua)	• Inducción de la ovulación (folículos > 3.5 cm de diámetro).	• 1500-3000 U.I., i.m. o i.v. 24 horas antes de la I.A./ monta.
<b>CONTRAINDICACIONES:</b>		
Ninguna.		
<b>PRECAUCIONES ESPECIALES:</b>		
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>		
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.		
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>		
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.		
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>		
Almacenar a no más de 25°C.		
<b>PERIODO DE RETIRO:</b>		
No tiene.		
<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>		
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.		
INFORMACIÓN ADICIONAL: <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>		
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.		
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.		
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.		
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.		
ELABORADO POR: Intervet International, B.V. Boxmeer – Holland		IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.