

## FICHA TÉCNICA

### CIRCUMVENT® PCV M USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>FÓRMULA:</b> | <p>Cada dosis de 2 ml contiene:</p> <p>Vacuna subunitaria de Circovirus Porcino Tipo 2 ORF2 (cápside) reproducida en baculovirus de línea celular de insecto (<i>Spodoptera frugiperda</i> Sf9) <math>\geq 1.3</math> R.P.*</p> <p><i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> inactivado, cepa 11 <math>\geq 1.3</math> R.P.*</p> <p>Vehículo c.b.p. 2 ml</p> <p>Contiene como adyuvante Microsol Diluvac Forte.<br/>Contiene etililenamina binaria como inactivante.<br/>También contiene gentamicina como conservador.</p> <p>*R.P.= Potencia relativa.</p> |
|-----------------|--|

FOTO DEL  
PRODUCTO

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>PRESENTACIÓN COMERCIAL:</b> | <p>Frascos con 100 ml (50 dosis).<br/>Frascos con 500 ml (250 dosis).</p>  |
| <b>INDICACIONES:</b>           | <p>Para la inmunización activa de lechones con el fin de reducir la carga viral y la excreción por Circovirus porcino (PCV) Tipo 2, asociadas con las enfermedades causadas por este virus y para reducir las lesiones pulmonares provocadas por la infección por <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>.</p> <p>La utilización de la vacuna reduce la mortalidad y la pérdida de peso durante el periodo de engorde.</p> |

#### ESPECIES DESTINO:

Cerdos

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión para inyección.

#### DESCRIPCIÓN:

Vacuna subunitaria contra Circovirus Porcino Tipo 2, bacterina de *Mycoplasma hyopneumoniae*

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por lechón por vía intramuscular a partir de las 3 semanas de edad.

Revacune 3 semanas después con una dosis igual.

#### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

##### *Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

2

|   |  |
|---|--|
| <b>Precauciones de Almacenamiento:</b>  |  |
| Almacenar en refrigeración entre 2-8°C.<br>Protéjase de la luz.<br>No congelar.   |  |
| <b>PERIODO DE RETIRO:</b>   |  |
| No requiere (0 días)  |  |
| <b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>  |  |
| Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos. |  |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>                                       |  |
| <b>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</b>   |  |
| <b>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</b>  |  |
| <b>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</b>   |  |
| <b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</b>  |  |
| ELABORADO POR:<br>Intervet Inc.<br>USA.   | IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:<br>INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL<br>Bajo Licencia de Intervet International B.V. |