

FICHA TÉCNICA

COCCIVAC® D2 USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	<p>Cada dosis como mínimo contiene:</p> <p><i>Eimeria acervulina</i> 600 oocistos <i>Eimeria brunetti</i> 200 oocistos <i>Eimeria maxima</i> 200 oocistos <i>Eimeria mivati</i> 400 oocistos <i>Eimeria necatrix</i> 400 oocistos <i>Eimeria tenella</i> 200 oocistos</p> <p>Vehículo c.b.p. 1 dosis</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frascos con 500, 1000, 2500, 5000, 10.000 o 25.000 dosis.
INDICACIONES:	Para la inmunización y como ayuda en la prevención de la coccidiosis de aves sanas de un día de edad mediante aplicación en cabina de aspersión, o de aves de 4 días de edad en el alimento

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral (engorde y gallinas ponedoras)

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión para diluir.

DESCRIPCIÓN:

vacuna diseñada para inocular un número controlado de oocistos capaces de estimular una sólida respuesta inmune contra 6 especies de coccidias económicamente importantes en aves de engorde y gallinas ponedoras.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Cabina de aspersión. Para aves de 1 día de edad.

La vacuna debe prepararse (o mezclarse) a una proporción de 210 ml de agua destilada por cada 1,000 dosis de vacuna.

Cada 100 aves deben recibir 210 ml de solución de la vacuna. (Puede adicionarse colorante como marcador).

Las instrucciones completas para el uso de la cabina de aspersión están disponibles con el proveedor.

Aspersión para aves de 4 días de edad.

1. Remueve cualquier medicamento o desinfectante del agua de bebida, 24 horas antes y después de la vacunación, y durante la misma.

2. El alimento rociado sobre papel debajo de la línea de alimentación incrementa la exposición de los pollitos a la vacuna.

3. Diluya la vacuna a una proporción de 1,000 dosis/400 ml de agua no clorada. Mezcle bien y colóquela en un rociador limpio.

4. Asperje la vacuna diluida sobre la superficie del alimento. Agite el aspersor durante la administración.

5. Para obtener mejores resultados, la vacuna debe ser asperjada sobre todo el alimento.

6. Evite mojar el alimento. Para lograr la correcta aplicación se debe únicamente humedecer la superficie del alimento.

7. Permita que las aves tengan el tiempo suficiente para ingerir los ooquistes que se encuentran sobre el alimento antes de administrar más alimento en los comederos o sobre el papel.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda normalmente para su uso en aves que reciben una alimentación que contenga coccidiostatos o altos niveles de antibióticos.

1

2

PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Consérvese entre 2 y 7°C. NO CONGELAR. Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.	
PERIODO DE RETIRO:	
No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio de las aves.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: INTERVET INC. USA.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.