

FICHA TÉCNICA

ENGEMYCIN LA®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Engemycin LA es una solución acuosa estéril que contiene por ml:

Oxitetraciclina (Clorhidrato) 100 mg
 Polivinilpirrolidona 250 mg
 Excipiente c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Frasco con 100 y 250 ml.

INDICACIONES:

Engemycin® LA es un antibiótico de amplio espectro con actividad bacteriostática frente a gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina como Gram positivos, Gram negativos, Rickettsias, Espiroquetas y Actinomicetos: *Brucella abortus*, *Chlamydia psittaci*, *Clostridium spp*, *Corynebacterium spp*, *Fusobacterium necrophorum*, *Haemophilus spp*, *Moraxella bovis*, *Mycoplasma spp*, *Pasteurella spp*, *Salmonella spp*, *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

- * Bovinos
- * Ovinos
- * Porcinos
- * Equinos
- * Caninos y felinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución acuosa inyectable

MECANISMO DE ACCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro: Complejo de Oxitetraciclina con Polivinilpirrolidona en solución acuosa inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Con este producto se puede producir un efecto de corta o larga acción de acuerdo al volumen aplicado en cada especie, como lo indica el siguiente cuadro.

Especie	Acción de 24 horas		Larga Acción	
	Vía de aplicación	ml/10 kg	Vía de aplicación	ml/10 kg
Bovino Adulto	I.V./I.M.	0.3	I.M.	1.0
Becerro	I.V./I.M.	0.8	I.M.	2.0
Caballo	I.V./I.M.	0.5	No se recomienda	



Potro	I.V./I.M.	1.0	No se recomienda	
Cerdo	I.M.	0.5	I.M.	1.0
Lechón	I.M.	0.8	I.M.	2.0
Borrego/cordero	I.V./I.M.	0.8	I.M.	2.0
Caninos y Felinos	S.C.	1.0	No se recomienda	
CONTRAINDICACIONES:				
1. Pueden observarse ocasionalmente reacciones alérgicas. Engemycin® LA está contraindicado en animales alérgicos a la Oxitetraciclina. 2. No debe administrarse en caballos cuando existe un tratamiento concomitante con corticosteroides. 3. En caballos, después de una inyección intramuscular, pudiera observarse una inflamación transitoria en el sitio de aplicación. 4. Al igual que ocurre con otras tetraciclinas, se debe tener precaución al tratar caballos en estado de estrés. 5. Engemycin® LA no debe diluirse con soluciones que tengan sales de calcio y otros minerales ya que puede producirse una precipitación de cristales por lo que la solución sería inadecuada para algunas vías de administración. 6. Inyecciones repetidas deben aplicarse en diferentes lugares, no deben inyectarse más de 20 ml en un mismo sitio. 7. No aplicarse simultáneamente con Hierro en lechones.				
PRECAUCIONES ESPECIALES:				
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>				
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.				
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>				
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.				
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>				
Consérvese en un lugar fresco y seco. No congelar. Almacenar por debajo de 30°C.				
PERIODO DE RETIRO:				
En carne: 21 días; En leche: 72 horas No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.				
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:				
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.				
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/				
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.				
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.				
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.				
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.				
ELABORADO POR: Intervet International GmbH Unterschleißheim, Alemania			IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.	