

## FICHA TÉCNICA

### ENTEROVAX®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis contiene: Reovirus aviar cepa 133/C6 $\geq 10^{4.4}$ TCID <sub>50</sub> . Excipientes c.s.p. 1 dosis.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frascos (viales) de Vidrio Tipo I por 1000 y 5000 dosis.
INDICACIONES:	Se recomienda administrar en pollos sanos, por aspersion o en el agua de bebida, como ayuda en la prevención de (artritis viral) tenosinovitis causada por Reovirus.

FOTO DEL PRODUCTO

**ESPECIES DESTINO:**

Aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras)

**FORMA FARMACÉUTICA:**

Vacuna liofilizada.

**DESCRIPCIÓN:**

ENTEROVAX es una vacuna viva contra tenosinovitis (artritis viral) causada por Reovirus.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Por aspersion al día de edad o en el agua de bebida a partir de la semana de edad.

*Por aspersion:* Use este método de rociado para vacunar aves al primer día de edad.

Una administración apropiada por aspersion gruesa de esta vacuna se lleva a cabo cuando se utiliza un gabinete rociador limpio que arroje aproximadamente 7 ml por cada 100 aves.

*En el agua de bebida:*

No mezcle la vacuna con el agua de beber sino hasta el momento de administrarla.

El agua de bebida se debe mezclar con leche en polvo para prevenir que el cloro, u otros componentes del agua, inactiven o desestabilicen el virus en la vacuna.

La leche en polvo se debe añadir al agua en una proporción de 3 gramos por 11 litros (una cucharadita llena por 3 galones americanos o 2.5 galones imperiales); o 90 gramos por 300 litros (una taza llena por 80 galones americanos o 66 galones imperiales).

**CONTRAINDICACIONES:**

No administre este producto por inyección. Estudios llevados a cabo han demostrado que la inyección producirá una mortalidad significativa en aves de un día de edad.

No administre este producto con un vacunador de gota ocular automático (ej.: Biojecter-Plus) a aves de un día de edad

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones para su uso en animales:***

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

***Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C.

NO CONGELAR

Protéjase de la luz.

1

2

<b>PERIODO DE RETIRO:</b>	
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.	
<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
<b>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</b>	
<b>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</b>	
<b>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</b>	
<b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</b>	
ELABORADO POR: Intervet Inc. USA	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.