

FICHA TÉCNICA

FINADYNE TRANSDERMAL®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada ml contiene:
Flunixin: 50 mg
Equivalente a 83 mg de flunixin meglumina.

PRESENTACIÓN
COMERCIAL:

Presentaciones: 100 ml, 250 ml y 1000 ml. Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones.

INDICACIONES:

Para la reducción de fiebre y el alivio de los signos clínicos de inflamación asociados con la enfermedad respiratoria bovina y mastitis.

ESPECIES DESTINO:

Bovino

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución para administración cutánea

MECANISMO DE ACCIÓN:

Flunixin (como Flunixin meglumina) es un ácido carboxílico, fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE). El efecto antipirético ha sido demostrado a partir de las 4 horas tras la aplicación del medicamento veterinario.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Unción dorsal continua. Administración única. La dosis de tratamiento recomendada es 3,33 mg de flunixin/kg peso vivo (equivalente a 1 ml/15 kg peso vivo). La cámara de dosificación del frasco está calibrada en kilogramos de peso vivo. Para asegurar la administración de una dosis correcta, el peso debe determinarse lo más exactamente posible.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en animales que padezcan trastornos cardíacos, hepáticos o renales, o en los que haya evidencia de úlcera o hemorragia gastrointestinal.

No usar en animales gravemente deshidratados, hipovolémicos ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad renal.

No usar el medicamento veterinario dentro de las 48 horas previas a la fecha revista de parto en vacas.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

FOTO DEL
PRODUCTO

1

2

<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar por debajo de 30°C	
PERÍODO DE RETIRO:	
Carne: 7 días. Leche: 36 horas.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Vet Pharma Friesoythe GmbH Alemania	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.