

FICHA TÉCNICA

INNOFUSION™-ILT USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis contiene >2248 UPF* de Herpesvirus vivo de pavo *Unidades formadoras de placa.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Ampollas criogénicas para 2000 dosis.
INDICACIONES:	<p>Imunización activa de embriones de pollo sanos de 18 días mediante la ruta <i>in ovo</i> o de pollos de 1 día de edad mediante aplicación subcutánea como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Marek y Laringotraqueitis Infecciosa.</p> <p>Para la Laringotraqueitis Infecciosa, la inducción de inmunidad ha sido demostrada en pollos de 2 semanas de edad, alcanzando la inmunidad completa a las 4 semanas.</p> <p>La duración de la inmunidad ha sido demostrada por al menos 60 semanas después de una vacunación simple.</p> <p>Para la Enfermedad de Marek, la inducción de inmunidad ha sido demostrada desde el quinto día de edad y la duración de inmunidad durará durante todo el período de riesgo.</p>

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión de células congeladas

DESCRIPCIÓN:

Vacuna para estimular la inmunización activa contra la Enfermedad de Marek y Laringotraqueitis Infecciosa.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración in ovo:

Inocule cada embrión de pollo de 18 días de edad con una dosis completa de 0.05 ml a 0.1 ml.

Administración por vía subcutánea:

Bajo la piel de la nuca. Inserte la aguja, debajo de la piel levantada, en dirección opuesta a la cabeza del pollo, administrando 0.2 ml por pollo.

Evite que la aguja entre en contacto con los músculos o los huesos del cuello.

La vacuna, una vez reconstituida, se debe mantener en un lugar fresco y se debe agitar leve y frecuentemente.

Todo el contenido del recipiente se debe usar en menos de una hora de haber mezclado la vacuna, o se debe desechar.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.



2

Precauciones de Almacenamiento:	
AMPOLLAS – Almacenar en un contenedor llenado con nitrógeno líquido.	
DILUENTE – Almacenar a temperatura ambiente (15 – 25°C).	
CONTENEDOR – Almacenar el contenedor de nitrógeno líquido de forma segura en posición vertical en un área limpia, bien ventilada y separada de los cuartos de incubación.	
PERIODO DE RETIRO:	
Animales que se sacrificarán para consumo humano no se deben vacunar durante los últimos 21 días.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: INTERVET INC. U.S.A.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.