

FICHA TÉCNICA

INNOVAX®-ILT-SB
USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis contiene: Herpesvirus vivo de pavo, cepa HVT/ILT-138 mínima 2756 PFU* Virus de la Enfermedad de Marek, serotipo 2, cepa SB-1 mínima 1950 PFU* *Unidades formadoras de placa
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Ampolletas con 2,000 dosis.
INDICACIONES:	La vacuna está recomendada para la vacunación de embriones de pollo sanos de 18 días de incubación por vía <i>in ovo</i> o para pollos de un día de edad, por vía subcutánea como auxiliar en la prevención de la enfermedad de Marek y la laringotraqueitis infecciosa.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves (embrión de pollo sano de 18 días de incubación, pollos de un día de edad)

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión celular congelada.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna contra la laringotraqueitis aviar y enfermedad de Marek, serotipos 2 y 3, virus modificado y vector vivo de la enfermedad de Marek.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para la vacunación por vía subcutánea, se inyectan 0.2ml por pollo en el cuello.

Para la vacunación in ovo, los huevos se inyectan a los 18 días de incubación usando 0.05ml por huevo. Una vez preparada, el frasco de la vacuna debe agitarse de manera suave y frecuente durante la vacunación.

Se debe utilizar todo el contenido en un lapso de 2 horas después de haber mezclado la vacuna.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Ampollas: Almacenar en un recipiente de nitrógeno líquido.

Diluyente: No congelar.

Contenedor: Almacene el contenedor de nitrógeno líquido de forma segura en posición vertical en un área seca y bien ventilada y lejos de las tomas de la incubadora y las cajas de pollos.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: INTERVET INC., U.S.A.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.

2