

FICHA TÉCNICA

NAFPENZAL® DC

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada inyector por 3 gramos contiene:										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Penicilina G Procaínica</td> <td style="text-align: right;">300000 U.I.</td> </tr> <tr> <td>Sulfato de Dihidroestreptomicina</td> <td style="text-align: right;">100 mg</td> </tr> <tr> <td>Nafcilina sódica</td> <td style="text-align: right;">100 mg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Excipientes c.s.p.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1 inyector</td> </tr> </table>	Penicilina G Procaínica	300000 U.I.	Sulfato de Dihidroestreptomicina	100 mg	Nafcilina sódica	100 mg	Excipientes c.s.p.			1 inyector
Penicilina G Procaínica	300000 U.I.										
Sulfato de Dihidroestreptomicina	100 mg										
Nafcilina sódica	100 mg										
Excipientes c.s.p.											
	1 inyector										
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja de 1 sachet de 4 jeringas y 4 toallas para limpieza. Caja de 1 sachet de 20 jeringas y 20 toallas para limpieza.										
INDICACIONES:	En bovinos en periodo seco para el tratamiento y control de las mastitis subclínicas producidas por <i>Streptococcus sp</i> , <i>Staphylococcus sp</i> , <i>Arcanobacterium pyogenes</i> y <i>Escherichia coli</i> .										

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Bovinos de leche

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión intramamaria

DESCRIPCIÓN:

Antibiótico intramamario de amplio espectro y larga acción

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria. Aplicar una jeringa por cada cuarto en el momento en que la vaca inicia el período seco. Ordeñar bien la ubre hasta que quede completamente seca. Limpieza y desinfección del pezón. Remover la tapa del extremo de la jeringa. Introducir en el canal del pezón y administrar lentamente el contenido. Hacer masaje en el pezón y en cada cuarto para favorecer la dispersión del producto.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con hipersensibilidad a los betalactámicos o a la dihidroestreptomicina.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar por debajo de 25°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después del parto no debe darse al consumo humano.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.

2