



FICHA TÉCNICA

NOBILIS IB 4-91®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Nobilis® IB 4-91 contiene el virus activo atenuado de la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa 4-91, cultivado en embriones de pollo SPF. Se presenta en forma liofilizada con estabilizador.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Frascos con 1000, 2000, 2500, 5000 o 10,000 dosis.
Caja con 10 frascos de 1000, 2000, 2500, 5000 o 10,000 dosis cada uno.
Recipientes con cubiertas de aluminio con 1000, 2000, 2500, 5000, 10,000 o 25,000 dosis.
Charola de plástico conteniendo 12 recipientes de aluminio con 1000, 2500, 5000, 10,000 o 25,000 dosis

INDICACIONES:

Nobilis® IB 4-91 está indicada para la inmunización de aves (pollo de engorda, reproductoras, progenitoras y gallinas de postura) contra la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa 4-91.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Pollos

FORMA FARMACÉUTICA:

Liofilizado para suspensión para uso en pollos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vacuna a virus activo liofilizada, para la inmunización de aves (pollo de engorda, reproductoras, progenitoras y gallinas de postura) contra la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa 4-91.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración por vía intranasal/ocular, aerosol o en el agua de bebida.

Aspersión aves de 1 día:

La vacuna se debe reconstituir en diluyente estéril o agua destilada. Hay que revisar que el aspersor no tenga restos de desinfectantes o detergentes (se recomienda que éste sólo se utilice para vacunaciones). El diluyente que contiene la vacuna será asperjado sobre las aves, a una distancia de 30 a 40 cm. prefiriéndose que la luz sea tenue. Se sugiere utilizar 250 a 300 ml de agua o diluyente estéril por cada 1000 aves y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión). Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser mezclada y administrada con Nobilis IB Ma5 para administración intranasal u ocular a partir de un día de edad.

Aspersión a aves mayores de 1 día de edad:

Reconstituir 1000 dosis en 1 litro de agua destilada, asperjar sobre las aves a una distancia de 30 a 40 cm

2

y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión). La vacunación por aspersion sólo podrá utilizarse en aves sanas.

Aplicación ocular y/o intranasal:

Disolver la vacuna en un frasco de diluyente estéril (de 30 ml por cada 1000 dosis) y administrar por medio de un gotero estandarizado aplicando una gota en el orificio nasal o el ojo. El vacunador deberá asegurarse de que el ave inhale la vacuna antes de soltarla.

Oral en el agua de bebida:

No utilizar ningún desinfectante o medicamento en el agua de bebida 48 horas antes y 24 después de la vacunación. Los viales deben abrirse debajo del agua; mientras que el liofilizado de los recipientes de aluminio puede agregarse al agua. La vacuna debe diluirse en agua limpia y fresca, libre de desinfectantes y detergentes.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese en refrigeración entre 2 y 8°C.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:
Intervet International, B.V.
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL
Bajo Licencia de Intervet International B.V.