



## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS IB MA5® USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

**FÓRMULA:**

Virus vivo atenuado de la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa Ma5  $\geq 3,0 \log^{10} \text{DIE}_{50}^*$  por dosis.

\*EID<sub>50</sub>: dosis infectiva 50% en embrión de pollo.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Caja con 10 frascos de 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 o 10,000 dosis c/u.

Recipiente con cubierta de aluminio con 1000, 2500, 5000, 10,000 o 25,000 dosis.

Charola de plástico conteniendo 12 recipientes de aluminio 1000, 2500, 5000, 10,000 o 25,000 dosis c/u.

**INDICACIONES:**

Para la inmunización de pollos sanos contra la Bronquitis Infecciosa serotipo Massachussets y otros serotipos relacionados. Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser mezclada y administrada con Nobilis® IB4-91. Lea la información sobre el producto Nobilis® IB4-91 antes de su uso.

**ESPECIES DESTINO:**

Pollos

**FORMA FARMACÉUTICA:**

Liofilizado para suspensión para uso en pollos

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

Vacuna a virus activo liofilizada, elaborada en embriones de pollo SPF. Contiene el virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa Ma5 (serotipo Massachussets) para la inmunización de pollos sanos contra la Bronquitis Infecciosa serotipo Massachussets y otros serotipos relacionados.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administración por vía intranasal/ocular, aerosol o en el agua de bebida.

**Aspersión aves de 1 día:**

La vacuna se debe reconstituir en diluyente estéril o agua destilada. Hay que revisar que el aspersor no tenga restos de desinfectantes o detergentes (se recomienda que éste sólo se utilice para vacunaciones). El diluyente que contiene la vacuna será asperjado sobre las aves, a una distancia de 30 a 40 cm. prefiriéndose que la luz sea tenue. Se sugiere utilizar 250 a 300 ml de

FOTO DEL  
PRODUCTO

1

2

agua o diluyente estéril por cada 1000 aves y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión).

**Aspersión a aves mayores:**

Reconstituir 1000 dosis en 1 litro de agua destilada, asperjar sobre las aves a una distancia de 30 a 40 cm y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión). La vacunación por aspersión sólo podrá utilizarse en aves sanas.

**Aplicación ocular o intranasal:**

Disolver la vacuna en un frasco de diluyente estéril (de 30 ml por cada 1000 dosis) y administrar por medio de un gotero estandarizado aplicando una gota en el orificio nasal o el ojo. El vacunador deberá asegurarse de que el ave inhale la vacuna antes de soltarla.

**Oral en el agua de bebida:**

No utilizar ningún desinfectante o medicamento en el agua de bebida 48 horas antes y 24 después de la vacunación. La vacuna debe diluirse en agua limpia y fresca, libre de desinfectantes y detergentes.

Se aconseja privar de agua a los animales durante algún tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas y edad del ave) con objeto de que tengan sed en el momento de aplicar la vacuna.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

*Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

*Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

*Precauciones de Almacenamiento:*

Consérvese en refrigeración entre 2 y 8°C.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

ELABORADO POR:  
Intervet International, B.V.  
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.