

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® CAV P4
 USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada vial contiene por dosis al menos: 3,0 log ¹⁰ TCID ₅₀ de virus CAA vivo atenuado, cepa 26P4, cultivado en embriones de pollo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Cajas con viales que contienen cada una 500, 1000, 2500, 5000 o 10.000 dosis.
INDICACIONES:	Para la vacunación de pollos contra la anemia de pollos de 6 semanas de edad en adelante hasta las 6 semanas previas al inicio de la postura de huevos.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral

FORMA FARMACÉUTICA:

Polvo liofilizado.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna viva contra anemia en pollos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para inyección intramuscular o subcutánea:

Reconstituya la vacuna en diluyente Dilavia de Intervet. Seleccione la cantidad de diluyente a ser usado de acuerdo con el número de dosis por vial (200 ml por 1000 dosis).

Administre 0.2 ml de la vacuna por inyección intramuscular o subcutánea.

Para aplicación por el método de punción del ala:

Reconstituya la vacuna en diluyente Dilavia Unisolve de Intervet. Seleccione la cantidad de diluyente a ser usado de acuerdo con el número de dosis por vial (13 ml por 1000 dosis).

Sumerja la aguja doble en la solución de vacuna antes de la vacunación de cada ave, para que ambas ranuras se llenen. Inserte la aguja por debajo y a través del ala.

Para aplicación por vía intramuscular o subcutánea en combinación con vacunas aviares inactivadas de Intervet

Reconstituya 1000 dosis de Nobilis CAV P4 con 2 ml de PBS estéril o diluyente de Marek de Intervet e inyecte asépticamente en la vacuna aviar emulsionada en aceite de Intervet (1000 dosis). Mezcle bien agitando el frasco de vacuna emulsionada.

Administre 0.5 ml de la vacuna mezclada por inyección intramuscular o subcutánea.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR

Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días)	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.