

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® COR4+IB+ND+EDS

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Avibacterium paragallinarum:

Serotipo A cepa 083 ≥ 1 CPD70*

Serotipo B cepa Spross ≥ 1 CPD70*

Serotipo C cepa H-18 ≥ 1 CPD70*

Serotipo variante tipo B cepa 48 ≥ 1 CPD70*

Virus de Bronquitis Infecciosa M41 ≥ 2.0 log² unidades HI

Virus de la EDS 76 cepa BC14 ≥ 3.2 log² unidades HI

Virus de la Enfermedad de Newcastle cepa Clone 30 ≥ 4.0 log² unidades HI/50° de una dosis conteniendo ≥ 50 unidades PD50

Vehículo c.b.p. 1 dosis
 *Dosis protectora del 70% de las aves

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos de 500 ml (1000 dosis)

INDICACIONES: Para la inmunización activa de pollas de 14 semanas en adelante contra la enfermedad de Coriza Infecciosa, Bronquitis Infecciosa, la Enfermedad de Newcastle y el Síndrome de la baja postura.

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras).

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión oleosa.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna inactivada contra infecciones por *Avibacterium paragallinarum*, virus de bronquitis infecciosa serotipo Massachussets, enfermedad de Newcastle y Síndrome de la caída de postura EDSV76 en aves.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección subcutánea en la parte inferior del cuello de 0,5 mL de vacuna en gallinas de 14 semanas de edad en adelante y no más tarde de 4 semanas antes de la puesta.

Para conseguir una protección máxima contra coriza aviar, las aves se deben vacunar con Nobilis Corvac- 4 al menos 6 semanas antes de la vacunación con Nobilis COR4+IB+ND+EDS.

Para conseguir un efecto de revacunación máximo contra la bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle, las aves se deben prevacunar con biológicos de virus vivos al menos 4 semanas antes de la vacunación con Nobilis COR4+IB+ND+EDS.

No es necesaria la prevacunación para el síndrome del descenso de la puesta 76.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

FOTO DEL PRODUCTO

1

2

PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días)	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.