

## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS® GUMBORO D78 USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

<b>FÓRMULA:</b>	Cada dosis contiene como mínimo 4,0 log <sup>10</sup> DIE <sub>50</sub> de la cepa de Gumboro D78. El liofilizado contiene estabilizantes y gentamicina.
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL:</b>	Viales con 500, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, 5.000 o 10.000 dosis.
<b>INDICACIONES:</b>	En pollos de engorde, pollas de reemplazo, ponedoras y reproductoras vía ocular, intranasal o en el agua de bebida, para la inmunización activa contra la enfermedad de Gumboro.

FOTO DEL  
PRODUCTO

#### ESPECIES DESTINO:

Aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras).

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Vacuna Liofilizada para reconstituir.

#### DESCRIPCIÓN:

Vacuna viva liofilizada, contra la enfermedad de Gumboro.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

##### *Agua de bebida:*

La vacuna debe disolverse en una cantidad de agua igual a la que consumirán los animales en aproximadamente 2 horas.

##### *Método en spray:*

La vacuna debe disolverse en agua en una cantidad de 1.000 dosis por litro. Debe diseminarse uniformemente entre las aves en forma de *spray* de gota gruesa a una distancia de 30 a 40 cm.

##### *Instilación intranasal/intraocular:*

La vacuna debe disolverse en solución salina fisiológica (normalmente 30 ml por 1.000 dosis) y administrarse con un gotero estandarizado. Debe aplicarse una gota desde una altura de varios centímetros en un orificio nasal o en un ojo.

Nobilis® Gumboro D78 puede administrarse a aves de 8-28 días de edad en el agua de bebida. La cepa D78 es efectiva ante el nivel de anticuerpos maternos que normalmente existe en crías de 8-28 días de vida. El momento óptimo de la vacunación depende del nivel alcanzado por los anticuerpos maternos.

En caso de que el nivel de anticuerpos varíe mucho se aconseja vacunar a los pollos dos veces, con un intervalo de una semana.

Nobilis® Gumboro D78 puede también ser administrado en forma segura al día de edad por medio de gota en el ojo y *spray* a aves sin o con bajos niveles de anticuerpos maternos.

#### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

##### *Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

2

<b>Precauciones de Almacenamiento:</b>	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz.	
<b>PERIODO DE RETIRO:</b>	
No requiere (0 días)	
<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
<b>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</b>	
<b>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</b>	
<b>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</b>	
<b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</b>	
ELABORADO POR: Intervet International BV. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.