

## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS® IB+ND INAC

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Componentes activos por dosis: Cepa de IB M41: induciendo $\geq 6.0 \log^2$ HI unidades ND Clone 30: Conteniendo $\geq 50 \text{ PD}^{50}$ O induciendo $\geq 4.0 \log^2$ HI unidades por 1/50 dosis.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frasco de 500 ml (1000 dosis).
INDICACIONES:	La vacuna se recomienda para la vacunación <i>booster</i> de reproductoras y ponedoras contra la Enfermedad de Newcastle y el tipo Massachusetts de la Bronquitis Infecciosa. En áreas donde no están presentes los serotipos variantes de BI, puede utilizarse una vacuna Nobilis® cuyo único componente de BI sea la cepa del serotipo Massachusetts. En áreas donde se conoce el predominio de serotipos variantes de BI, debe emplearse una vacuna Nobilis® que incluya cepas variantes de BI.

FOTO DEL PRODUCTO

#### ESPECIES DESTINO:

Aves de corral.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión de agua en aceite.

#### DESCRIPCIÓN:

Vacuna contra la bronquitis infecciosa aviar y la enfermedad de Newcastle

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se indica 0.5 ml de vacuna por vía intramuscular en el muslo o músculo de la pechuga o por vía subcutánea en la parte baja del cuello. Nobilis® IB + ND debe de ser administrado a aves de alrededor de 16-20 semanas de edad, pero no menos de 4 semanas antes del rompimiento de la postura.

Para un óptimo efecto de refuerzo, las aves deben de ser vacunadas con vacunas vivas contra Bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle.

#### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

##### *Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

##### *Precauciones de Almacenamiento:*

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C.

NO CONGELAR

Protéjase de la luz.

#### PERIODO DE RETIRO:

No requiere (0 días)

2

<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
<b>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</b>	
<b>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</b>	
<b>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</b>	
<b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</b>	
ELABORADO POR: Intervet BV. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.