

## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® DHPPI + L4

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

**FÓRMULA:**

Componentes activos por dosis después de la liofilización:

Virus vivo del Distemper canino, cepa Onderstepoort	≥10 <sup>4.0</sup> DICT <sub>50</sub>
Virus vivo del Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan LPV3	≥10 <sup>4.0</sup> DICT <sub>50</sub>
Virus vivo del Parvovirus canino, cepa 154	≥10 <sup>7.0</sup> DICT <sub>50</sub>
Virus vivo de la Parainfluenza canina	≥10 <sup>5.5</sup> DICT <sub>50</sub>

Nobivac L4 (Solvente)

Leptospira Canicola (Cepa Ca-12-000)	5300 U <sup>1</sup>
Leptospira Icterohaemorrhagiae (Cepa Ic-02-001)	540 U <sup>1</sup>
Leptospira Australis (Cepa As-05-073)	1000 U <sup>1</sup>
Leptospira Grippotyphosa (Cepa Gr-01-005)	1000 U <sup>1</sup>

Preservativo: Timerosal 100 µg

Diluyente:

PBS 0.01M:	1 ml
NaCl	8 mg
KCl	0.2 mg
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	0.2 mg
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	1.44 mg
Agua para inyecciones	1 ml

<sup>1</sup>Unidades ELISA de masa antigénica

FOTO DEL  
PRODUCTO

**PRESENTACIÓN  
COMERCIAL:**

Caja con 5 frascos de una dosis.  
Caja con 25 frascos de una dosis.

**INDICACIONES:**

Para la inmunización activa de perros contra

- moquillo canino;
- hepatitis canina contagiosa provocada por adenovirus canino tipo 1;
- enfermedad provocada por parvovirus canino;
- enfermedad respiratoria provocada por parainfluenza y adenovirus canino tipo 2;
- para prevenir la infección y la excreción urinaria provocada por
- L. interrogans* serogrupo Canicola serovar Canicola;
- L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni;
- L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae;

2

	- <i>L. interrogans</i> serogrupo Australis serovar Bratislava; - <i>L. kirschneri</i> serogrupo Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang; - <i>L. kirschneri</i> serogrupo Grippotyphosa serovar Grippotyphosa	
<b>ESPECIES DESTINO:</b>		
Caninos		
<b>FORMA FARMACÉUTICA:</b>		
Vacuna viva liofilizada.		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>		
Es una vacuna múltiple liofilizada contra Distemper Canino, Adenovirus Canino Tipo 2 , Parvovirus Canino y virus de la Parainfluenza Canina y para para prevenir la infección y la excreción urinaria provocada por varios tipos de <i>Leptospira</i> spp.		
<b>DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:</b>		
Se utiliza un mL de Nobivac L4 (solvente) para reconstituir un vial de la vacuna liofilizada Nobivac DHPPi. El contenido de un vial de la vacuna reconstituida debe administrarse por vía subcutánea.		
<b>CONTRAINDICACIONES:</b>		
Ninguna.		
<b>PRECAUCIONES ESPECIALES:</b>		
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>		
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.		
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>		
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.		
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>		
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz.		
<b>PERIODO DE RETIRO:</b>		
No aplica.		
<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>		
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.		
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>		
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.		
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.		
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.		
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.		
ELABORADO POR: Intervet International BV. Países Bajos.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.	