

## FICHA TÉCNICA

# Nuflor®

USO VETERINARIO

### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada 100 g contiene: Florfenicol 300 mg. Excipiente c.b.p. 1 ml.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frasco de 100 ml. Frasco de 250 ml.
INDICACIONES:	Para el tratamiento de las enfermedades respiratorias de los bovinos y cerdos asociadas con bacterias susceptibles a la fórmula ( <i>Mannheimia haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Haemophilus somnus</i> y <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> ).

FOTO DEL PRODUCTO

**ESPECIES DESTINO:**

Bovinos y Cerdos.

**FORMA FARMACÉUTICA:**

Suspensión inyectable.

**DESCRIPCIÓN:**

Solución inyectable que contiene florfenicol, antimicrobiano de amplio espectro.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Bovinos:** La dosis recomendada es de 20 mg/kg de peso (1 ml/15 kg) por vía intramuscular, de preferencia en la musculatura del cuello. Se deben administrar un total de dos inyecciones con 48 horas de diferencia. Alternativamente administre a los bovinos una sola inyección subcutánea de 40 mg/kg de peso (2 ml/15 kg). No administre más de 10 ml en cada lugar. La inyección debe ser aplicada solamente en el área de la musculatura del cuello.

**Cerdos:** La dosis recomendada es de 15 mg/kg de peso. Se recomiendan dos aplicaciones con 48 horas de intervalo cada una. El tratamiento debe administrarse por vía intramuscular.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

*Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

*Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

*Precauciones de Almacenamiento:*

No almacenar a temperaturas superiores de 25 °C.  
No refrigerar.

**PERIODO DE RETIRO:**

*Bovinos:*

Carne y vísceras. Cuando se administre por vía intramuscular no deben sacrificarse animales para consumo humano hasta 30 días después del último tratamiento o después de los 44 días del último tratamiento cuando se use la vía subcutánea.  
Leche. No usar en vacas lecheras en producción, cuya leche esté destinada para consumo humano.

*Cerdos:*

Carne y vísceras: 18 días

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

Schering-Plough Santé Animale  
Francia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.