

FICHA TÉCNICA

PM-ONEVAX-C®
USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis contiene: <i>Pasteurella multocida</i> Cepa PM-1 17,6x10 ⁷ UFC Solución estabilizadora de sucrosa Suero Bovino
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 10 frascos de 1000 Dosis cada uno
INDICACIONES:	En pollos y pavos para la prevención del Cólera aviar causada por <i>Pasteurella multocida</i> .

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Pollos y Pavos

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vacuna contra *Pasteurella multocida*. Cultivo vivo avirulento aislado en aves

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Pollos: Use para vacunar pollos de 10 a 12 semanas de edad, por punción en la membrana del ala y revacunar una segunda vez de 18 a 20 semanas de edad, como una ayuda en la prevención de pasteurelosis (cólera aviar) causada por *Pasteurella multocida* Tipo 1. Entre vacunaciones, debe haber un período de no menos de 6 semanas y no más de 10 semanas.

Pavos: Use para vacunar pavas ponedoras de 15 o más semanas de edad, por punción en la membrana del ala, como una ayuda en la prevención de pasteurelosis (cólera aviar) causada por *Pasteurella multocida* Tipo 3. Las aves deben vacunarse en la membrana del ala, inicialmente de 15 a 18 semanas de edad y de nuevo 8 semanas más tarde. Las pavas ponedoras se deben vacunar por lo menos dos veces con la vacuna viva de cólera aviar, por vía oral, antes de aplicar la vacuna en el ala. El período de tiempo entre la última vacunación oral y la primera vacunación en el ala, no debe ser de más de 6 semanas. En áreas de exposición endémica de cólera aviar pueden ser necesarias vacunaciones adicionales en la membrana del ala, cada 6 a 8 semanas de por vida.

CONTRAINDICACIONES:

Pollos: No se recomienda una vacunación inicial en pollos de más de 12 semanas de edad debido a la posible formación de granulomas grandes en el sitio de la inoculación, y esto puede rebajar la calidad de las aves en el momento del sacrificio.



2

<p>Pavos: El usar esta vacuna en pavos que no se han vacunado previamente por vía oral, puede causar reacciones severas después de la vacunación, incluyendo postración y muerte.</p>	
<p>PRECAUCIONES ESPECIALES:</p>	
<p><i>Precauciones para su uso en animales:</i></p>	
<p>En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.</p>	
<p><i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i></p>	
<p>En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.</p>	
<p><i>Precauciones de Almacenamiento:</i></p>	
<p>Almacene entre 2° y 7° C.</p>	
<p>PERIODO DE RETIRO:</p>	
<p>No vacune dentro de los 21 días antes del sacrificio.</p>	
<p>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</p>	
<p>Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.</p>	
<p>INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/</p>	
<p>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</p>	
<p>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</p>	
<p>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</p>	
<p>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</p>	
<p>ELABORADO POR: Intervet Inc. Omaha, Nebraska</p>	<p>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.</p>