



## FICHA TÉCNICA

### PORCILIS PORCOLI DF®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Por dosis de 2 ml:	
	– Adhesina fímblica F4ab (K88ab)	Título de Ac <sup>1</sup> ≥ 9,0 log <sub>2</sub>
	– Adhesina fímblica F4ac (K88ac)	Título de Ac <sup>1</sup> ≥ 5,4 log <sub>2</sub>
	– Adhesina fímblica F5 (K99)	Título de Ac <sup>1</sup> ≥ 6,8 log <sub>2</sub>
	– Adhesina fímblica F6 (987P)	Título de Ac <sup>1</sup> ≥ 7,1 log <sub>2</sub>
	– Toxoide LT	Título de Ac <sup>1</sup> ≥ 6,8 log <sub>2</sub>

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos con 20 y 50 mL

INDICACIONES: Inmunización pasiva de los lechones mediante la inmunización activa de las cerdas adultas/nulíparas, para reducir la mortalidad y los síntomas clínicos, como diarrea, debidos a la enterotoxosis neonatal durante los primeros días de vida, causada por las cepas de *E. coli* que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P) y/o produce LT.

ESPECIES DESTINO:

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vacuna contra la enterotoxosis neonatal de los lechones causada por *E. coli*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección intramuscular en cerdas adultas/nulíparas de 2 ml por animal, en la región del cuello situada por detrás de la oreja.

Programa de vacunación:

*Vacunación básica:* las cerdas adultas/nulíparas que todavía no hayan sido vacunadas con el producto deben recibir una primovacuna entre 6 y 8 semanas antes de la fecha prevista para el parto, y una inyección de memoria 4 semanas después.

*Revacunación:* se debe administrar una sola inyección durante la segunda mitad de las gestaciones siguientes, preferiblemente entre 2 y 4 semanas antes de la fecha prevista para el parto.

FOTO DEL PRODUCTO



2

CONTRAINDICACIONES:	
Ninguna.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Conservar a +2 °C - +8 °C. No congelar. Una vez abierto, el producto debe utilizarse en las 3 horas siguientes.	
PERÍODO DE RETIRO:	
0 días	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International BV Boxmeer – Holanda	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.