

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® AR-T DF
USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:
Toxina dermonecrótica de *Pasteurella multocida* como toxoide (Proteína d0 45 unidades por dosis/cerdas). $\geq 6.2 \log_2 \text{TN}^1$

Células inactivadas de *Bordetella bronchiseptica*, cepa No. 92932 (Concentrado bacteriano 45 mg por dosis/cerda). $\geq 4.2 \log_2 \text{Agutl}^2$

Vehículo c.b.p. 2 ml

¹Título promedio de neutralización de la toxina obtenido después de la vacunación repetida con media dosis en conejos.
²Título promedio de aglutinación obtenido después de una vacunación repetida con media dosis en conejos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Viales de 50 y 100 ml (25, 50 dosis respectivamente)

INDICACIONES:

Indicada para la inmunización de hembras reproductoras con el objetivo de proteger a los lechones mediante los anticuerpos de origen materno contra la rinitis atrófica, contiene un toxoide obtenido a partir de una cepa de *Pasteurella multocida* tipo D toxigénica, más una cepa de *Bordetella bronchiseptica*, seleccionada por su capacidad patogénica e inmunogénica en los lechones

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna inactivada para la prevención de la rinitis atrófica en los cerdos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar una dosis de 2 ml por inyección intramuscular a cerdos de 18 semanas de edad y mayores.
La vacuna debe aplicarse preferentemente justo por detrás de la oreja del animal.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-8°C.
Protéjase de la luz.
NO CONGELAR.

1

2

PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días).	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. USA.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.